

Gebruuchsinformation

DEQUONAL®

1,5 / 3,5 mg, Lösung

Für Erwachsene und Kinder

*Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie die gesamte
Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn
sie enthält wichtige Informationen für Sie.*

*Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche
Verschreibung erhältlich. Um einen
bestmöglichen Behandlungserfolg zu
erzielen, muss Dequonal jedoch
vorschriftsmäßig angewendet werden.*

- *Heben Sie die Packungsbeilage auf.
Vielleicht möchten Sie diese später
nochmals lesen.*
- *Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie
weitere Informationen oder einen Rat
benötigen.*
- *Wenn bei akuten Beschwerden nach
einigen Tagen keine Besserung eintritt,
müssen Sie einen Arzt aufsuchen.*

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. *Was ist Dequonal und wofür wird es
angewendet?*
2. *Was müssen Sie vor der Anwendung von
Dequonal beachten?*
3. *Wie ist Dequonal anzuwenden?*
4. *Welche Nebenwirkungen sind möglich?*
5. *Wie ist Dequonal aufzubewahren?*
6. *Weitere Informationen*

1. Was ist Dequonal und wofür wird es
angewendet?

Dequonal ist ein gebrauchsfertiges
Arzneimittel zur Anwendung in der
Mundhöhle auf Basis von Dequaliniumchlorid
und Benzalkoniumchlorid.

Dequonal wird angewendet:

- Zur unterstützenden zeitweiligen
Behandlung bei Entzündungen der
Mundschleimhaut.
- Zur zeitweiligen Anwendung bei
Mundgeruch (soweit durch Keimbildung
in der Mundhöhle verursacht).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung
von Dequonal beachten?

2.1 Dequonal darf nicht angewendet
werden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegen
Dequalinium-, Benzalkoniumchlorid oder
einen der anderen Bestandteile.
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter
2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes
durch Levomenthol).
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder
anderen Atemwegserkrankungen, die mit
einer ausgeprägten Überempfindlichkeit
der Atemwege einhergehen. Die
Inhalation von Dequonal kann aufgrund
des Gehalts an Levomenthol zu Atemnot
führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- Nicht auf Wunden anwenden.

2.2 Besondere Vorsicht bei der
Anwendung von Dequonal ist
erforderlich

- Kinder: Zum Spülen oder Gurgeln sollte
Dequonal nur dann angewendet werden,
wenn der Patient die Gurgeltechnik
beherrscht. Daher ist die Anwendung
z. B. bei Säuglingen und Kleinkindern
nicht geeignet.
- Kontaktallergien: Patienten mit
allergischen Kontaktallergien sollten
die Wirkstoffe von Dequonal
(Dequaliniumchlorid und Benzalkonium-
chlorid) nicht anwenden, da eine
Sensibilisierung möglich ist.
- Augen: Vermeiden Sie Augenkontakt mit
dem Arzneimittel.

2.3 Anwendung von Dequonal mit
anderen Arzneimitteln oder anderen
Mitteln

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln sind
keine bekannt.
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder
Apotheker trotzdem, wenn Sie andere
Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem
eingenommen haben, auch wenn es sich um
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
handelt.
Die Wirkstoffe von Dequonal werden durch
Eiweiß, Serum und Eiter inaktiviert und in
Gegenwart von üblichen Seifen, außerdem
durch anionische, oberflächlich aktive
Substanzen, Materialien wie poröse
Stoffe (Gummi, Baumwolle, Kork) und
Plastikmaterialien (Polyvinylchlorid,
Polyäthylen), Phospholipide und andere
lipidhaltige Substanzen abgeschwächt.

2.4 Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine ausreichenden Daten
zur Sicherheit einer Anwendung bei
Schwangeren vor.
Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie
Dequonal nur anwenden, wenn Ihr
behandelnder Arzt dies für unbedingt
erforderlich hält.
Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe von
Dequonal in die Muttermilch übergehen.
Deshalb sollte Dequonal nicht von stillenden
Frauen angewendet werden, es sei denn,
Ihr behandelnder Arzt hält dies für unbedingt
erforderlich.

2.5 Verkehrstüchtigkeit und das
Bedienen von Maschinen

Für Dequonal sind keine negativen
Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit
und das Bedienen von Maschinen bekannt.
Es sind keine Vorsichtsmaßnahmen
erforderlich.

2.6 Wichtige Informationen über
bestimmte sonstige Bestandteile
von Dequonal

Dequonal enthält 6 Vol.-% Alkohol.
Alkoholranke könnten daher bei
Anwendung von Dequonal einen Rückfall
erleiden.
Benzalkoniumchlorid und Macrogolglycerol-
hydroxystearat können Hautreizungen
hervorrufen.

3. Wie ist Dequonal anzuwenden?

Bitte halten Sie sich an die nachfolgenden
Anwendungsvorschriften, da Dequonal sonst
nicht richtig wirken kann.

Vorbereiten der Pumpe

Vor dem erstmaligen Gebrauch des Sprays
und nach mehr als 3 Tagen Nichtgebrauch
betätigen Sie die Pumpe 6mal, um
vorhandene Luft zu entfernen.

Dosierungsanleitung

Dequonal, Gurgellösung
Morgens und abends soll nach dem Essen
mit je 5 ml der Lösung unverdünnt gespült
werden.

Dequonal, Lösung zum Sprühen

Sprühen Sie alle zwei Stunden – in schweren
Fällen auch häufiger – mit 3-5 Sprühstößen
die Dequonal-Lösung in die Mundhöhle.

Die erkrankten Stellen in der Mundhöhle
sollten Sie bei angehaltenem Atem besprühen.
Hierzu drücken Sie das Sprühventil 3-5mal
bis zum Anschlag nieder (pumpen)!

Art der Anwendung

Wenden Sie Dequonal in der Mundhöhle an.

Dauer der Anwendung

Dequonal soll ohne ärztlichen bzw.
zahnärztlichen Rat nicht längerfristig
angewendet werden. Sollten die Beschwer-
den von Fieber begleitet werden oder die
Beschwerden nicht nach spätestens 3 Tagen
erheblich nachlassen, ist ein Arzt aufzusuchen,
da eine behandlungsbedürftige Entzündung
vorliegen kann, die ernste Folgen an Herz
und Nieren auslösen kann.

Wenn Sie eine größere Menge Dequonal
angewendet haben, als Sie sollten

Ein Verschlucken von Dequonal ist
unschädlich, Vergiftungserscheinungen nach
Schlucken von Dequonal-Lösung sind nicht
bekannt.

Weitere Fragen

Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung
des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind
möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Dequonal
Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei
jedem auftreten müssen.

Selten (weniger als 1 Behandelter von
1 000) können auftreten:

- Überempfindlichkeit
- Verfärbungen von Zunge, Zähnen oder
Prothesen

Sehr selten (weniger als 1 Behandelter
von 10 000) können auftreten:

- Lokale allergische und nicht allergische
Reaktionen (z. B. Schwellung, Quaddeln,
Schleimhautreizungen, Juckreiz,
vereinzelt auch mit Atemnot)
- Geschmacksstörungen

Mit nicht bekannter Häufigkeit (auf
Grundlage der verfügbaren Daten nicht
abschätzbar) können auftreten:

- Anaphylaktische Reaktionen (mit
Begleitsymptomen)
- Sensibilisierung (Ausbildung einer
Überempfindlichkeit gegenüber den
Wirkstoffen oder einen der sonstigen
Bestandteile)
- Kehlkopfkrampf bei Säuglingen und
Kindern bis zu 2 Jahren mit der
Folge schwerer Atemstörungen durch
Levomenthol
- Anschwellung der Rachenschleimhaut
- Entzündung der Mundschleimhaut
- Verzögerung der Wundheilung bei
Anwendung auf Wunden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
wenden Sie sich an Ihren Arzt, Zahnarzt
oder Apotheker. Dies gilt auch für
Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind. Sie
können Nebenwirkungen auch direkt dem
Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte, Abt.
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger
Allee 3, D-53175 Bonn, Website:
www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie
Nebenwirkungen melden, können Sie dazu
beitragen, dass mehr Informationen über die
Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung
gestellt werden.

5. Wie ist Dequonal aufzubewahren?

Bewahren Sie alle Arzneimittel für Kinder
unzugänglich auf.

5.1 Hinweis zum Verfallsdatum

Das Verfallsdatum dieser Packung ist
auf dem Behältnis und der Faltschachtel
aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung
bitte nicht mehr nach diesem Datum.

5.2 Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25°C aufbewahren.

5.3 Haltbarkeit nach Anbruch

Dequonal ist nach Anbruch 3 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

6.1 Was Dequonal enthält

10 g Lösung zur Anwendung in der
Mundhöhle enthalten:

als arzneilich wirksame Bestandteile:
Dequaliniumchlorid 1,5 mg
Benzalkoniumchlorid 3,5 mg

als weitere Bestandteile:
Ethanol 96 %, Glycerol, Levomenthol,
Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.),
Minzöl, Natriumdihydrogenphosphat-
Dihydrat, Natriumhydroxid, Pfefferminzöl,
gereinigtes Wasser.

6.2 Wie Dequonal aussieht und Inhalt
der Packung

Dequonal ist in Packungen mit 1 Flasche zu
200 ml gebrauchsfertiger Gurgellösung
zur Anwendung in der Mundhöhle erhältlich.
Dequonal ist in Packungen mit
1 Sprühflasche zum Pumpen (ohne Treibgas)
zu 50 ml Lösung zur Anwendung in der
Mundhöhle erhältlich.

6.3 Pharmazeutischer Unternehmer und
Hersteller

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustraße 87-93
D-65203 Wiesbaden
www.kreussler.com
E-Mail: info@kreussler.com

6.4 Stand der Information

September 2025

Eigenschaften

Dequonal ist eine gebrauchsfertige, unge-
färbte, wasserklare Lösung und braucht nicht
verdünnt zu werden.
Dequonal wird zur unterstützenden
zeitweiligen Behandlung bei Entzündungen
im Mund angewendet.
Dequonal unterstützt die Linderung des
Schmerzes und lässt die Entzündungen
schnell abklingen.
Die Bildung von Zahnbelägen wird
vermindert.
Dem natürlichen Geschmack nach Fenchel
und Pfefferminze ist es zu verdanken, dass
Dequonal auch von Kindern gern
angewendet wird.
Kinder und ältere oder schwerkranke
Patienten, die nicht in der Lage sind zu
gurgeln, können mit der Sprühlösung
behandelt werden. Auch auf Reisen
und am Arbeitsplatz ist die Dequonal
Sprühlösung bequem anwendbar.

Hinweis

In der Sprühflasche bleibt ein kleiner Rest
Dequonal zurück, dem aber schon durch
eine entsprechende
erhöhte Abfüllmenge Rechnung getragen
wurde. Es ist also sichergestellt, dass der an-
gegebene Inhalt von 50 ml voll genutzt wer-
den kann.
Apothekenpflichtig
Zulassungsnummer: 6430539.00.00

Package leaflet

DEQUONAL®

1.5 / 3.5 mg solution

For adults and children

Dear patient!

Please read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.

This medicine is available without prescription. However, you still need to use Dequonal according to the instructions to get the best results.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- In case of acute disease, you must talk to a doctor if you do not feel better after a couple of days.

What is in this leaflet

1. What Dequonal is and what it is used for
2. What you need to know before you use Dequonal
3. How to use Dequonal
4. Possible side effects
5. How to store Dequonal
6. Other information

1. What Dequonal is and what it is used for

Dequonal is a ready-to-use medicine for oromucosal use, based on dequalinium chloride and benzalkonium chloride. Dequonal is used for:

- temporary supportive treatment of inflammation of the oral mucosa.
- temporary use in case of bad breath (if caused by germs in the oral cavity).

2. What you need to know before you use Dequonal

2.1 Do not use Dequonal in

- case of known hypersensitivity to dequalinium, benzalkonium chloride or any of the other ingredients.
- infants and toddlers up to 2 years of age (risk of laryngeal spasm due to levomenthol).
- patients with bronchial asthma or other respiratory diseases associated with pronounced hypersensitivity of the airways. Due to its levomenthol content, inhaling Dequonal can cause breathing difficulties or trigger an asthmatic attack.
- Do not use on wounds.

2.2 Take special care with Dequonal

- Children: Dequonal should only be used for rinsing or gargling if the patient masters the gargling technique. Therefore, the use e.g. in infants and toddlers is not suitable.
- Contact allergy: Patients with allergic contact allergies should not use the active substances of Dequonal (dequalinium chloride and benzalkonium chloride) as sensitization is possible.
- Eyes: Avoid medicine contact with eyes.

2.3 Using Dequonal with other medicines or other substances

Interactions with other medicines are not known. However, please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines, including medicines obtained without a prescription. The active substances of Dequonal are inactivated by protein, serum, and pus and are diminished in the presence of conventional soaps, furthermore by anionic, surface-active substances, materials such as porous substances (rubber, cotton, cork) and plastic materials (polyvinyl chloride, polyethylene), phospholipids and other substances containing lipids.

2.4 Pregnancy and breast-feeding

No adequate safety data on the use of Dequonal in pregnant women is available. If you are pregnant, only use Dequonal if your attending doctor considers it absolutely necessary. It is not known whether the active substances of Dequonal are excreted into breast milk. Therefore, Dequonal should not be used by breast-feeding women unless their attending doctor considers it absolutely necessary.

2.5 Driving and using machines

Dequonal has no known negative effects on the ability to drive and use machines. No precautions are required.

2.6 Important information about some of the ingredients of Dequonal

Dequonal contains 6% alcohol by volume. People who suffered from alcohol abuse in the past could experience relapse if they use Dequonal. Benzalkonium chloride and macrogolglycerol hydroxystearate can cause skin irritation.

3. How to use Dequonal

Please use this medicine as described in this leaflet, otherwise Dequonal is less effective.

Preparing the pump

To remove air from the spray nozzle, operate the pump 6 times before using the spray for the first time and after more than 3 days of non-use.

Dosage

Dequonal, gargle

In the morning and evening, after the meals, rinse with 5 ml of the undiluted solution.

Dequonal, spray

Every two hours – in severe case even more frequently – spray Dequonal 3-5 times into the oral cavity. Spray the affected areas in the oral cavity while holding your breath. To do so, press the spray valve 3-5 times down to the stop! (pump)!

Method of administration

Use Dequonal in the oral cavity.

Duration of use

Dequonal should not be used for extended periods without medical or dental advice. If the disease is accompanied by fever or if the symptoms do not improve significantly after 3 days at the latest, a doctor must be consulted. An underlying inflammation requiring treatment may exist, which could have serious consequences on heart and kidneys.

If you use more Dequonal than you should

Swallowing Dequonal is harmless, symptoms of poisoning after swallowing Dequonal solution are not known.

Further questions

If you have further questions on the administration of the medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, Dequonal can cause side effects, although not everybody gets them.

Rarely (up to 1 in 1,000 treated people) may occur:

- Hypersensitivity
- Discoloration of tongue, teeth or dentures

Very rarely (up to 1 in 10,000 treated people) may occur:

- Local allergic and non-allergic reactions (e.g. swelling, wheals, mucosal irritation, itching, sporadically also with breathing difficulties)
- Taste disorders

With unknown frequency (cannot be estimated from the available data) may occur:

- Anaphylactic reactions (with accompanying symptoms)
- Allergization (development of hypersensitivity to the active substances or to one of the other ingredients)
- Laryngeal spasm caused by levomenthol in infants and toddlers up to 2 years of age with consequential severe breathing difficulties
- Swelling of the mucous membrane of the throat
- Oromucosal inflammation
- Delayed wound healing if applied on wounds

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, dentist or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, website: www.bfarm.de. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Dequonal

Keep all medicines out of the sight and reach of children.

5.1 Shelf life information

The expiry date of this pack is printed on the container and carton. Please do not use this pack after that date.

5.2 Storage conditions

Do not store above 25° C.

5.3 Shelf life after first opening

After first opening Dequonal has a shelf life of 3 months.

6. Other information

6.1 What Dequonal contains

10 g oromucosal solution contain:

as active substances:

Dequalinium chloride 1.5 mg
Benzalkonium chloride 3.5 mg

as other ingredients:

Ethanol 96%, glycerol, levomenthol, macrogolglycerol hydroxystearate (Ph. Eur.), mint oil, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium hydroxide, peppermint oil, purified water.

6.2 What Dequonal looks like and contents of the pack

Dequonal is available in packs of 1 bottle of 200 ml ready-to-use gargle for oromucosal use. Dequonal is available in packs of 1 bottle with spray pump (without gas propellant) of 50 ml oromucosal solution.

6.3 Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustraße 87-93
D-65203 Wiesbaden, Germany
www.kreussler.com
E-mail: info@kreussler.com

6.4 Date of revision of the text

September 2025

Properties

Dequonal is a ready-to-use, colourless, water-clear solution and does not need to be diluted. Dequonal is used for temporary supportive treatment of inflammation in the mouth. Dequonal supports pain relief and resolves the inflammation quickly. Dental plaque formation is reduced. Thanks to its natural taste of fennel and peppermint, Dequonal is also popular with children. Children and elderly or critically ill patients who are unable to gargle can be treated with the spray. Dequonal spray is also convenient when travelling and at the workplace.

Note

A small amount of Dequonal remains in the spray bottle, but this has already been taken into account by increasing the filling quantity accordingly. It is therefore ensured that the specified content of 50 ml can be used completely. Pharmacy only
Marketing Authorisation Number: 6430539.00.00