

Distorsal®

Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer
Dr. Assmann Veterinärspécialitäten GmbH
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

Mitvertreiber und Hersteller
Biokanol Pharma GmbH
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

WERAVET 13 Distorsal

Mischung zum Eingeben für Tiere:

für Pferd, Rind, Schwein, Hund

Rhus toxicodendron C 30

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

Zusammensetzung

1 ml (981,89 mg) Mischung enthält:

Wirkstoff:

Rhus toxicodendron Dil. C 30 99,55 mg

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 43% (m/m), Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 18% (V/V) Alkohol.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den veterinär-homöopathischen Arzneimittelbildern ab, dazu gehören:

- Lahmheiten bei Pferd, Rind, Schwein und Hund, (verschlimmert durch Ruhe und gebessert durch Bewegung), häufig als Folge von Überanstrengungen
- Akute, traumatische und chronische Gelenk-, Bänder- und Sehnenkrankungen in der Folge von:
 1. Verstauchungen
 2. Bänderzerrungen
 3. Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei akut infektiösen und septischen Gelenkerkrankungen

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Pferd, Rind, Schwein, Hund

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet:

Pferd	20 Tropfen
Rind	20 Tropfen
Schwein	15 Tropfen
Hund	10 Tropfen

Art der Anwendung

Zum Eingeben über das Futter oder über das Trinkwasser

Am besten ins Trinkwasser gelöst oder auf Brot bzw. in ca. 10 ml Wasser gelöst über das Futter geben.

Dauer der Anwendung

2 mal täglich bis zum Eintritt der Heilung.

Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres: Ein homöopathisches Arzneimittel ist bei gesunden Tieren dazu geeignet, ein dem homöopathischen Arzneimittelbild entsprechendes Krankheitsbild (Symptomatik) auszulösen.



Wartezeit

Pferd, Rind, Schwein: essbare Gewebe: 0 Tage
Pferd, Rind: Milch: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behälter und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate

Nach Ablauf dieses „Haltbarkeitsdatums nach Anbruch“ sind die noch im Behälter vorhandenen Reste zu verwerfen.

Besondere Warnhinweise

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel und Maßnahmen.

Bei folgenden Anzeichen sollten Sie den Tierarzt aufsuchen, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Diagnose bedarf:

- Fieber
- Akute und starke Entzündungszeichen wie Rötze, Hitze, Schwellung, Schmerz und Funktionsstörung
- Gleichzeitiges Auftreten von Schwellungen an mehreren Gelenken (Polyarthritis)
- Schwere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
- Anhaltende, unklare, periodisch oder neu auftretende Beschwerden.

Bei allen genannten Krankheitsbildern ist vom Tierarzt über die Notwendigkeit einer weiterführenden Behandlung zu entscheiden.

Die Anwendung von WERAVET 13 Distorsal sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen „Simile-Prinzips“ erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei folgenden Erkrankungen darf WERAVET 13 Distorsal nur zur unterstützenden Behandlung angewendet werden:

- Mangelzustände infolge verminderter Aufnahme lebensnotwendiger Nährstoffe.
- Erkrankungen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen wie z.B. Sehnen-, Muskel- oder Bänderisse und Frakturen.

Vor Behandlungsbeginn sollten die Ursachen der Beschwerden daher möglichst weitgehend abgeklärt sein.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden
Entfällt

Anwendung während Trächtigkeit und Laktation

Zur Anwendungssicherheit von WERAVET 13 Distorsal während der Trächtigkeit und der Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von WERAVET 13 Distorsal aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Stand der Information März 2010

Weitere Angaben

Originalpackung mit 20 ml und 50 ml

Apothekenpflichtig

Zulassungsnummer: 6157925.00.00



Biokanol Pharma GmbH

Kehler Straße 7 · 76437 Rastatt
Tel.: 07222-78679-0 · Fax: 07222-78679-9
www.biokanol.de · info@biokanol.de