

Zur Individualtherapie, Anwendung und Dosierung gemäss Vorgabe der beratenden Fachperson.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne fachlichen Rat eingenommen werden.

Vor Gebrauch schütteln!

In der Originalpackung dicht verschlossen aufbewahren.

Lagerung bei Raumtemperatur (15°C bis 25°C).

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem angegebenen Verfalldatum.

Gegenanzeige:

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Arnica montana (Arnika) oder gegen andere Korbblütler.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Regenaplex Nr. 23c ist erforderlich in der Schwangerschaft und Stillzeit. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung vorliegen, sollte das Arzneimittel dann nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. **Wenden Sie Regenaplex Nr. 23c auch bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt an**, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Wie ist Regenaplex Nr. 23c anzuwenden?

Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Soweit nicht anders verordnet, sollte im Rahmen der Selbstmedikation daher nur eine Gabe von 5 Tropfen eingenommen werden.

Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Andere Warnhinweise: Enthält 50 Vol.-% Alkohol