

EN

Instruction for use:

Nebusal® 7%

Sterile 7% hypertonic sodium chloride solution.
For inhalation via a nebulizer only.

Indication for use:

Nebusal 7% sodium chloride solution helps to increase the mobilisation of secretion in the lower respiratory tract in patients with persistent mucus by its osmotic effects.

Warnings:

- If recommended by a physician a bronchodilator may be used before treatment. Patients with reduced lung capacity (e.g. lung infection, lung cancer, only one lung) must use a bronchodilator before treatment with Nebusal 7%
- Nebusal should not be used for patients with haemoptysis
- If the patient displays a tendency to develop dyspnoea or hypersensitivity, Nebusal 7% should then be used under medical supervision
- Only use Nebusal 7% with a clean nebulizer. Consult the nebulizer manufacturer's instructions for the cleaning method
- Do not mix with other medications
- For expiry date see box and do not use after the expiration date
- Not suitable for use in children under 6 years of age

Temporary irritations (coughing, hoarseness) or reversible constriction of the bronchia may occur.

Abrupt cessation of Nebusal 7% may impair breathing and provoke wheezing. If using medication for respiratory condition, seek medical advice on how to use Nebusal 7% before starting.

Do not use if vial is pierced or damaged.

For single use only.

If undesirable side effects do occur, discontinue treatment and seek advice from your doctor or pharmacist.

Frequency of use: 4ml solution inhaled via a nebulizer not more than twice a day

Pack sizes: 60 x 4ml

Application temperature: Room temperature

Date of issue: June 2017

Local Distributor:

Accord Healthcare Ltd. North Harrow, HA1 4HF, UK. For further information or to report an adverse event relating to Nebusal please call +44 (0)1271 385257 or email medinfo@accord-healthcare.com

DE

Gebrauchsanweisung:

Nebusal® 7%

Sterile 7%-ige hypertone Natriumchloridlösung.

Nur zur Inhalation mit einem Vernebler.

Anwendungsgebiete:

Nebusal 7% Natriumchloridlösung erhöht durch seine osmotische Wirkung bei Patienten mit anhaltendem Schleim die Mobilisierung von Sekreten in den unteren Atemwegen.

Warnhinweise:

- Auf Empfehlung eines Arztes kann ein Bronchodilatator vor der Behandlung verwendet werden. Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion (z.B. bei einer Lungeninfektion, bei Lungenkrebs, bei nur einer vorhandenen Lunge) müssen vor der Behandlung mit Nebusal einen Bronchodilatator verwenden
- Nebusal darf von Patienten mit Hämoptyse (Bluthusten) nicht angewendet werden
- Wenn der Patient zu Dyspnoe (Atemnot) oder Überempfindlichkeit neigt, sollte Nebusal 7% unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden
- Verwenden Sie Nebusal 7% nur mit einem sauberen Vernebler. Verwenden Sie die Reinigungsmethode, die der Hersteller des Verneblers in der Gebrauchsanweisung angibt
- Nicht mit anderen Medikamenten mischen
- Bitte das Verfalldatum auf der Verpackung beachten und nicht nach dem Verfalldatum verwenden
- Nicht für die Anwendung bei Kindern unter sechs Jahren geeignet

Vorrübergehende Irritationen (Husten, Heiserkeit) oder eine reversible Verengung der Bronchien können auftreten.

Das abrupte Absetzen von Nebusal 7% kann die Atmung beeinträchtigen und zu Atembeschwerden (Keuchen) führen.

Wenn Sie Medikamente gegen Atemwegserkrankungen einnehmen, holen Sie sich vor der ersten Einnahme ärztlichen Rat zur Verwendung von Nebusal 7% ein.

Nicht verwenden, wenn die Ampulle porös oder beschädigt ist.

Nur für den einmaligen Gebrauch.

Wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, unterbrechen Sie die Behandlung und konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Häufigkeit der Anwendung: 4ml Lösung, inhaliert mit einem Vernebler, nicht häufiger als zweimal täglich

Darreichungsform: 60 x 4ml

Anwendungstemperatur: Raumtemperatur

Stand der Information: Juni 2017

Vertrieb: Teva GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm

Vertrieb für Österreich: ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH
Donau-City-Straße 11, Ares Tower, Top 13
1220 Wien

Vertrieb für die Schweiz: Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14,
CH 4051 Basel

FR

Instructions d'emploi:

Nebusal® 7%

Solution saline stérile de chlorure de sodium hypertonique à 7%. Uniquement pour inhalation par nébuliseur.

Indications :

La solution de Nebusal 7% de chlorure de sodium à 7%, par son effet osmotique, permet d'accroître la mobilisation des sécrétions au niveau des voies respiratoires inférieures chez les patients présentant des mucosités épaisses.

Précautions :

- Si recommandé par votre médecin, un bronchodilatateur peut être utilisé avant le traitement. Les patients souffrant d'une capacité pulmonaire réduite (p.ex. infection pulmonaire, cancer pulmonaire, patient ayant qu'un seul poumon) doivent utiliser un bronchodilatateur avant le traitement
- Nebusal 7% ne sera pas utilisé par les patients souffrant de rejet de sang en cas de toux.
- Si le patient affiche une tendance à développer une dyspnée ou une hypersensibilité, Nebusal 7% doit être utilisé sous surveillance médicale.
- Utilisez Nebusal 7% uniquement avec un nébuliseur propre. Consultez les consignes de nettoyage fournies par le fabricant du nébuliseur.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

Des irritations passagères (toux, enrouement) ou une bronchoconstriction réversible peuvent apparaître.

Un broncho-dilatateur peut être utilisé avant le traitement.

L'arrêt brutal du traitement par Nebusal 7%, peut provoquer un gêne respiratoire et un sifflement bronchique.

En cas d'utilisation de médicaments pour des maladies respiratoires, veuillez consulter votre médecin avant d'entamer l'utilisation de Nebusal 7%.

Ne pas utiliser si le flacon est percé ou endommagé.

Réservé à un usage unique, ne pas ré-utiliser.

En cas d'effet secondaire, arrêter le traitement et consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Fréquence d'utilisation : 4 ml de solution inhalée à l'aide d'un nébuliseur, une à deux fois par jour au maximum.

Emballage: 60 flacons de 4 ml

Température d'application: A utiliser à température ambiante

Date de mise à jour : Juin 2017

Distributeur Belgique: Teva Pharma Belgium, Laarstraat 16, 2610 Wilrijk

Distribution pour la Suisse: Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14,
CH 4051 Basel

NL

Gebruiksaanwijzing:

Nebusal® 7%

Steriele hypertone zoutoplossing van 7% natriumchloride. Uitsluitend voor inhalatie via een vernevelaar.

Toepassingsgebied:

Door zijn osmotische werking, helpt Nebusal natriumchloride oplossing (7%) bij het losmaken van slijm in de onderste luchtwegen bij patiënten met vastzittend slijm.

Waarschuwingen:

- Indien aangeraden door uw arts kan, vooraf aan de behandeling, een bronchodilatator gebruikt worden. Patiënten met een verminderde longcapaciteit (bv longinfectie, longkanker, patiënt met slechts één long) dienen vooraf aan de behandeling, een bronchodilatator te gebruiken.
- Nebusal mag niet gebruikt worden bij patiënten die bloed ophoesten.
- Als een patiënten de neiging vertoont tot het ontwikkelen van ademnood of overgevoeligheid, dient Nebusal 7% onder medisch toezicht gebruikt te worden.
- Gebruik Nebusal enkel met een schone vernevelaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor het schoonmaken van de vernevelaar.
- Niet met andere geneesmiddelen mengen.
- Zie de vervaldatum op de verpakking. Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar

Een voorbijgaande irritatie (hoesten, heesheid) of voorbijgaande vernauwing van de luchtwegen kunnen optreden.

Voor de behandeling kan een luchtwegverwijder worden gebruikt.

Het plots stoppen met Nebusal, kan de ademhaling hinderen en een piepende ademhaling veroorzaken.

Bij gebruik van geneesmiddelen voor de luchtwegen, gelieve uw arts te raadplegen alvorens Nebusal te gebruiken.

Niet gebruiken als het flesje doorboord of beschadigd is.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Als er bijwerkingen optreden, stop dan met de behandeling en vraag uw arts of apotheker om advies.

Dosering: 4 ml oplossing geïnhaled via een vernevelaar, maximaal tweemaal per dag.

Verpakking: 60 flesjes van 4 ml.

Temperatuur bij gebruik: Kamertemperatuur

Datum van uitgifte: juni 2017

Plaatselijke distributeur.

Indien verdere informatie over het product is gewenst, neem dan s.v.p. contact op met de lokale vertegenwoordiger:

In België: Teva Pharma Belgium, Laarstraat 16, 2610 Wilrijk

In Nederland: Teva Nederland, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland.

ES

Instrucciones de uso:

Nebusal® 7%

Solución estéril hipertónica de cloruro de sodio al 7%.

Sólo para inhalación por medio de un nebulizador.

Indicaciones de uso:

Debido a sus efectos osmóticos la solución de cloruro de sodio Nebusal 7% ayuda a aumentar la movilización de las secreciones en las vías respiratorias inferiores.

Advertencias:

- Si ha sido recomendado por un médico, puede utilizarse un broncodilatador antes del tratamiento. Los pacientes con capacidad pulmonar reducida (por ejemplo, infección pulmonar, cáncer de pulmón, un solo pulmón) deben utilizar un broncodilatador antes del tratamiento con Nebusal 7%
- Nebusal no debe utilizarse en pacientes con hemoptisis
- Si el paciente muestra una tendencia a desarrollar disnea o hipersensibilidad, se debe utilizar Nebusal 7% bajo supervisión médica
- Utilice Nebusal 7% sólo con un nebulizador limpio. Para limpiar el nebulizador siga las instrucciones recomendadas por el fabricante
- No mezclar con otros medicamentos
- Para la fecha de caducidad, véase el recuadro y no usar después de la fecha de caducidad
- No está indicado para uso en niños menores de 6 años

Pueden aparecer irritaciones transitorias (tos, ronquera) o constricción reversible de los bronquios.

La suspensión repentina de Nebusal 7% puede perjudicar la respiración y provocar sibilancias.

Si está utilizando medicamentos para la enfermedad respiratoria, consulte a su médico antes de empezar a utilizar Nebusal 7%.

No utilizar si el vial está perforado o dañado.

Para un solo uso.

Si aparecen efectos secundarios no deseados, suspenda el tratamiento y consulte a su médico o farmacéutico.

Frecuencia de uso: solución de 4 ml inhalada por medio de nebulizador no más de dos veces al día.

Tamaño de los envases: 60 x 4 ml

Temperatura de aplicación: temperatura ambiente

Fecha de expedición: Junio 2017

Distribuidor en España: Teva Pharma S.L.U. Anabel Segura, 11. Edificio Albatros B, 1ª planta. 28.108 - Alcobendas. Madrid.

PT

Instruções de utilização:

Nebusal® 7%

Solução de cloreto de sódio hipertónica a 7% estéril

APENAS PARA INALAÇÃO

Indicação de utilização:

A solução de cloreto de sódio Nebusal 7% ajuda a aumentar a mobilização das secreções no trato respiratório inferior em doentes com muco persistente, através dos seus efeitos osmóticos.

Advertências:

- Se recomendado por um médico, pode ser utilizado um broncodilatador antes do tratamento. Doentes com capacidade pulmonar reduzida (por exemplo, infecção pulmonar, cancro de pulmão, apenas um pulmão) devem utilizar um broncodilatador antes do tratamento com Nebusal.
- Nebusal 7% não deve ser utilizado em doentes com hemoptise.
- Se o doente apresentar uma tendência para desenvolver dispneia ou hipersensibilidade, o Nebusal 7% deverá ser utilizado com supervisão médica.
- Utilize Nebusal 7% apenas com um nebulizador limpo. Consulte as instruções do fabricante do nebulizador relativas ao método de limpeza.
- Não misture com outras medicações.
- Consulte o prazo de validade na caixa e não utilize após essa data.
- Não é adequado para utilização em crianças com idade inferior a 6 anos.

Em casos raros, podem ocorrer irritações temporárias (tosse, rouquidão) ou constricção reversível dos brônquios.

A interrupção abrupta de Nebusal 7% pode comprometer a respiração e causar sibilos.

Se estiver a utilizar medicação para um problema respiratório, antes de começar aconselhe-se com um médico sobre como utilizar Nebusal 7%.

Não utilize se o frasco estiver perfurado ou danificado.

Exclusivamente para utilização única.

Caso ocorram efeitos secundários, interrompa o tratamento e aconselhe-se com o seu médico ou farmacéutico.

Frequência de utilização: solução de 4ml inalada através do nebulizador não mais do que duas vezes por dia.

Tamanho da embalagem 60 x 4ml

Temperatura da aplicação: temperatura ambiente

Data da edição: Junho de 2017

Distribuidor local:

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Lagoas Park, Edifício 5-A, Piso 2,

2740-245 Porto Salvo,

PORTUGAL

IT

Istruzioni per l'uso

Nebusal® 7%

Soluzione ipertonica sterile di cloruro di sodio 7%

Da inalare esclusivamente tramite nebulizzatore.

Indicazioni per l'uso :

Grazie ai suoi effetti osmotici, Nebusal 7% soluzione di cloruro di sodio al 7% aiuta ad aumentare la mobilizzazione delle secrezioni nelle vie respiratorie inferiori in pazienti con muco persistente.

Avvertenze :

- Prima del trattamento, se consigliato dal medico, è possibile usare un broncodilatatore. I pazienti con ridotta capacità polmonare (ad es. pazienti con infezione polmonare o cancro al polmone, oppure pazienti con un polmone solo) devono usare un broncodilatatore prima del trattamento con Nebusal 7%.
- Nebusal 7% non deve essere usato in pazienti con emottisi.
- Se il paziente mostra una tendenza a sviluppare dispnea o ipersensibilità, Nebusal 7% deve essere usato sotto supervisione medica
- Nebusal 7% deve essere usato esclusivamente con un nebulizzatore pulito. Consultare le istruzioni del fabbricante del nebulizzatore per il metodo di pulizia
- Non miscelare con altri medicinali
- Per la data di scadenza consultare la scatola. Non usare oltre la data di scadenza
- Non adatto per l'uso in bambini di età inferiore ai 6 anni

Possono verificarsi irritazioni temporanee (tosse, raucedine) o costrizione reversibile dei bronchi.

65NOT7957/C

65NOT7957/C



65NOT7957/C

L'interruzione improvvisa di Nebusal 7% può compromettere la respirazione e provocare un respiro sibilante. Se si utilizza il medicinale per una condizione respiratoria, richiedere un parere medico su come usare Nebusal 7% prima di iniziare.

Non usare se il flaconcino è forato o danneggiato.

Esclusivamente monouso.

Se si verificano effetti indesiderati, interrompere il trattamento e richiedere un parere al proprio medico o farmacista.

Frequenza d'uso : Soluzione da 4 ml inalata tramite un nebulizzatore non più di due volte al giorno

Dimensione della confezione: 60 x 4 ml

Temperatura di applicazione : Temperatura ambiente

Data di emissione: Giugno 2017

Distributore locale:

Per ulteriori informazioni o per segnalare un evento avverso correlato a Nebusal 7%, contattare Teva Italia S.r.l., Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano

Distribuzione per la Svizzera: Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, CH 4051 Basel

NO

Bruksanvisning:

Nebusal® 7%

Steril 7% hyperton natriumkloridopløsning.

Kun for inhalering med nebulisator.

Indikasjoner for bruk:

Nebusal 7% natriumkloridopløsning har osmotiske effekter som hjelper til å øke mobiliseringen av sekret i de nedre luftveiene hos pasienter med vedvarende slimdannelse.

Advarsler:

- Hvis det er anbefalt av en lege kan en bronkodilator brukes før behandling. Pasienter med nedsatt lungkapasitet (f.eks. lungeinfeksjoner, lungekreft, har kun én lunge), må bruke en bronkodilator før behandling med Nebusal.
- Nebusal 7% skal ikke brukes hos pasienter med hemoptyse.
- Hvis pasienten viser tendenser til å utvikle dyspné eller overfølsomhet, bør Nebusal 7% kun brukes under medisinsk tilsyn.
- Nebusal 7% skal kun brukes med en ren nebulisator. Les produsentens instruksjoner for rengjøring av nebulisatoren.
- Må ikke blandes med andre legemidler.
- Se esken for informasjon om utløpsdato. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke egnet til bruk hos barn under 6 år.

Forbigående irritasjoner (hosting, heshet) eller reversible sammentrekninger av bronkiene kan oppstå.

Brå avslutning av bruken av Nebusal 7% kan hemme pusting og fremkalle hvesende pust.

Hvis du bruker andre legemidler som påvirker åndedrettet, må du rådføre deg med lege om hvordan Nebusal 7% skal brukes, før behandlingen påbegynnes.

Må ikke brukes hvis hetteglasset er punktert eller skadet.

Kun til engangsbruk.

Hvis bivirkninger oppstår, må behandlingen avsluttes og råd innhentes fra lege eller apotek.

Dosering: 4ml oppløsning inhaleres via en nebulisator, opptil to ganger per dag.

Pakningsstørrelse: 60 x 4ml

Temperatur ved bruk: Romtemperatur

Utgivelsesdato: Juni 2017

Lokal distributør: Teva Norway AS, Hagaløkkveien 13, 1383 Asker, Norge

SV

Bruksanvisning:

Nebusal® 7%

Steril 7% hyperton natriumkloridopløsning.

Endast för inhalation via en nebulisator.

Avsedd användning:

Nebusal 7% natriumkloridopløsning har osmotiska effekter som hjälper till att öka mobiliseringen av sekret från de nedre luftvägarna hos patienter med ihållande slembildning.

Varningar:

- Om det rekommenderats av en läkare, kan ett bronkvidgande läkemedel användas före behandling. Patienter med reducerad lungkapacitet (t.ex. pga. av lunginfektion, lungcancer eller som bara har en lunga) måste använda ett bronkvidgande läkemedel innan behandling med Nebusal.
- Nebusal 7% ska inte användas av patienter med hemoptysis (blodupphostningar).
- Om patienten visar tendenser att utveckla dyspné eller överkänslighet, bör Nebusal 7% användas under medicinsk övervakning.
- Nebusal 7% ska endast användas med en ren nebulisator. Se anvisningarna från nebulisator tillverkaren angående lämplig rengöringsmetod.
- Blanda inte med andra läkemedel.
- Se utgångsdatum på kartongen och använd inte efter utgångsdatumet.
- Ej lämpligt för användning till barn under 6 år.

Tillfälliga irriterationer (hosta, heshet) eller reversibel sammandragning av bronkerna kan förekomma.

Om behandling med Nebusal 7% upphör plötsligt kan det försämra andningen och framkalla väsande andning.

Om något annat läkemedel som påverkar andningen används, rådfråga läkare om hur Nebusal 7% ska användas innan behandlingen påbörjas.

Använd inte om injektionsflaskan är punkterad eller skadad.

Endast för engangsbruk.

Om biverkningar uppkommer, ska behandlingen avbrytas och läkare eller apotekspersonal kontaktas för rådgivning.

Användningsfrekvens: 4 ml lösning inhaleras via en nebulisator högst två gånger dagligen.

Förpackningsstorlek: 60x4 ml.

Användningstemperatur: Rumtemperatur

Utgivningsdatum: Juni 2017

Lokal distributör:

i Sverige: Actavis AB, Strandbergsgatan 61, 112 89 Stockholm

i Finland: Teva Finland, PL 67, 02631 Esbo

DK

Bruksanvisning:

Nebusal® 7%

Steril 7% hypertonisk natriumkloridopløsning.

Kun til inhalation ved hjælp af en nebulisator.

Indikationer for brug:

Nebusal 7% natriumkloridopløsning hjælper med at løsne slim i de nedre luftveje hos patienter med vedvarende slim gennem en osmotisk virkning.

Advarsler:

- Der kan bruges en bronkodilator før behandling med Nebusal 7%, hvis lægen anbefaler det. Patienter med dårlige lunger (f.eks. lungeinfektion, lungekræft, kun én lunge) skal bruge en bronkodilator før behandlingen.
- Nebusal 7% må ikke bruges af patienter med sygdommen hæmoptyse.
- Hvis patienten udviser en tendens til at udvikle åndedrætsbesvær eller allergi, bør Nebusal 7% anvendes under lægeligt tilsyn.
- Nebusal 7% må kun anvendes sammen med en ren nebulisator. Læs producentens anvisninger om rengøring af nebulisatoren.
- Må ikke blandes med anden medicin.
- Se udløbsdatoen på pakningen, og brug ikke Nebusal efter udløbsdatoen.
- Ikke egnet til brug til børn under 6 år.

Der kan forekomme midlertidig irritation (hoste, hæshed) eller forbigående sammentrækning af bronkierne.

Pludseligt ophør med brug af Nebusal 7% kan give åndedrætsbesvær og hvesende eller pibende vejtrækning.

Bruges Nebusal 7% til behandling af vejtrækningsproblemer, skal du rådføre dig med din læge om, hvordan Nebusal 7% anvendes, før du starter.

Må ikke bruges, hvis ampullen er åbnet eller beskadiget.

Kun til engangsbrug.

Hvis der opstår uønskede bivirkninger, skal du stoppe behandlingen og rådføre dig med din læge eller apotekets personale.

Dosering: 4 ml opløsning inhaleret ved hjælp af en nebulisator højst 2 gange daglig

Pakningsstørrelser: 60 x 4ml

Anvendelsestemperatur: Stuetemperatur

Udstedelsesdato: Juni 2017

Forhandler i Danmark:

Teva Denmark A/S, 2860 Søborg

FI

Käyttöohjeet:

Nebusal® 7%

Steriili 7-prosenttinen hypertoninen natriumkloridiliuos.

Valmiste on tarkoitettu vain inhaloitavaksi sumuttimen kautta.

Käyttöaihe:

Nebusal 7% -natriumkloridilioksen osmoottinen vaikutus edistää alahengitysteissä olevien sitkeiden eritteiden irtoamista.

Varoitukset:

- Lääkärin suosituksesta voidaan käyttää keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ennen hoitoa. Potilaiden, joilla on pienentynyt keuhkojen tilavuus (esim. keuhkoinfektio, keuhkosityöpä tai vain yksi keuhko) on käytettävä keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ennen Nebusal-hoitoa.
- Nebusalia ei tulisi käyttää, jos potilaalla on veriyskösiä.
- Jos potilaalla ilmenee taipumusta hengenahdistukseen tai yliherkkyyteen, Nebusal 7% on annettava lääkärin valvonnassa.
- Nebusal 7% -valmistetta saa antaa vain puhtaasta sumuttimesta. Katso puhdistusmenetelmä sumuttimen valmistajan käyttöohjeista.
- Tätä valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkeaineiden kanssa.
- Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta. Valmistetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Ei sovi käytettäväksi alle 6-vuotiaille lapsille.

Tilapäistä ärsytystä (yskimistä, käheyttä) tai keuhkoputkien ohimenevää supistumista voi esiintyä.

Nebusal 7% -hoidon äkillinen keskeyttäminen voi vaikeuttaa hengitystä ja pahentaa hengityksen vinkumista.

Jos käytät lääkitystä hengityssairauden hoitoon, älä aloita Nebusal 7% -valmisteen käyttämistä ennen kuin olet kysynyt lääkäriltä neuvoja.

Valmistetta ei saa käyttää, jos ampullissa on reikä tai se on vaurioitunut. Vain kertakäyttöön.

Jos ei-toivottuja sivuvaikutuksia ilmenee, lopeta valmisteen käyttö ja käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Antotiheys: 4 ml liuosta inhaloidaan sumuttimen kautta enintään kaksi kertaa päivässä.

Pakkauskoost: 60 x 4 ml

Käyttölämpötila: Huoneenlämpö

Julkaisupäivämäärä: Kesäkuu 2017

Paikallinen jälleenmyyjä: Teva Finland, PL 67, 02631 Espoo

	EN	DE	FR	NL	ES	PT
	Explanation of symbols	Bedeutung der Symbole	Explanation of symbols	Verklaring van de symbolen	Explicaciones de los símbolos.	Explicação dos símbolos
	Sterile	Steril	Sterile	Steriel	Estéril	Estéril
	For single use	Nicht wiederverwenden	Pour usage unique	Voor eenmalig gebruik	Para un solo uso	Para utilização única
	Lower and upper storage temperature 4°C - 25°C	zwischen 4°C und 25°C lagern	Température de conservation minimale et maximale 4°C - 25°C	Minimale en maximale bewaartemperatuur 4°C - 25°C	Temperaturas de almacenamiento inferiores y superiores 4°C- 25°C	Conservar a uma temperatura entre 4°C - 25°C
	Manufacturer	Hersteller	Fabriquant	Fabrikant	Fabricante	Fabricante
	Consult instructions for use	Gebrauchsanweisung beachten	Consultez la notice avant utilisation	Raadpleeg de bijsluiting voor gebruik	Seguir las instrucciones de uso	Consulte as instruções de utilização
	Batch code	Chargenbezeichnung	numéro de lot	partij	Lote	Lote
	Use by	Verwendbar bis	date de péremption	houdbaarheidsdatum	Usar antes de	Utilizar até

	IT	NO	SV	DA	FI
	Spiegazione dei simboli	Forklaring av symboler	Symbolforklaring	Forklaring af symboler	Merkkien selitykset
	Sterile	Steril	Steril	Steril	Steriili
	Non riutilizzabile	Kun til engangsbruk	För engangsbruk	Engangsbrug	Kertakäyttöinen
	Temperatura di conservazione minima e massima 4°C - 25°C	Oppbevares ved 4°C - 25°C	Lägsta och högsta förvaringstemperatur 4°C-25°C	Nedre og øvre grænse for opbevaringstemperatur 4°C-25°C	Säilytyslämpötilan ylä- ja alaraja 4°C - 25°C
	Produttore	Tilvirker	Tillverkare	Fremstiller	Valmistaja
	Consultare le istruzioni prima dell'uso	Vennligst følg bruksanvisningen	Följ bruksanvisningen	Læs indlægsedlen før brug	Noudata käyttöohjeita
	Lotto	Batch-nummer	Batchnummer	Batchnr.	Erä
	Scadenza	Brukes innen	Bäst före-datum	Holdbarhed	Viimeinen käyttöpäivämäärä