


DESTAsept® DERM pro

Hautdesinfektionsmittel, farblos

Zur Hautdesinfektion
und für Kühlumschläge
2-Propanol 70 % (V/V) Lösung



Anwendungsgebiete:

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge.

Art der Anwendung:

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig benetzt und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig benetzt und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig benetzt und 10 Minuten* lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

* Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 3 Minuten bestätigt.

Auf einen Blick:

- ✓ bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- ✓ begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia-Viren), Rota-Viren inaktivierend

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			15 s	30 s	1 min	1,5 min	3 min
Hautantiseptik							
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Injektionen und Punktionen*	VAH		•				
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen sowie operativen Eingriffen*	VAH				•		
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik auf talgdrüsenreicher Haut*	VAH						•
Mikrobiologische Wirksamkeit							
wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid)	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•				
wirksam gegen alle behüllten Viren	EN 14476**	inkl. HBV/HIV/HCV	•				
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige und hohe Belastung			•		

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests
(quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

** gemäß EN 14476, Prüfvirus MVA (Vacciniavirus)

Zusammensetzung:

In 100 g sind enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1g;
sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

VAH
gelistet



Auf Pfuhlst 1,
D-66589 Merchweiler
+49 (0)6825 - 8019956

DESTAsept® DERM pro

Hautdesinfektionsmittel, farblos

Gegenanzeigen:

DESTAsept® DERM pro Hautdesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Nebenwirkungen:

Beim Einreiben/Einsprühen der Haut mit DESTAsept® DERM pro können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise:

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwerissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. DESTAsept® DERM pro Hautdesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Warnhinweise:

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Stand der Information: 11/2016

Zul.-Nr. 1599.98.99

Gutachten

PD Dr. med. F.-A. Pitten, Gießen:

Gutachten zur Hände- und Hautdesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien.

Prof. Dr. med. habil. Kramer, Greifswald:

Gutachten zur Hautdesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien.

Dr. Steinmann, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegen BVDV und Vaccinia-Virus nach RKI/DVV Leitlinie.

DESTAsept® DERM pro – Gebindegrößen und Zubehör

Artikel	Art.-Nr.	PZN
250 ml Flasche	4880051	10088823
1000 ml Flasche	4880052	10088846
5 L Kanister	4880053	10088852
Dosierpumpe 20 ml für 5 L Kanister	4862064	
Dosierpumpe 30 ml für 5 L Kanister	4862065	
Auslaufhahn für 5 L Kanister	4862058	
Kanisterschlüssel für 5 L Kanister	4862059	



Auf Pflust 1,
D-66589 Merchweiler
+49 (0)6825 - 8019956

 Hersteller/ Pharmazeutischer Unternehmer:
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld