

Centrum für Ihn 50+

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für Männer ab 50 Jahren

Zutaten: Calciumhydrogenphosphat; Magnesiumoxid; Calciumcarbonat; Füllstoffe: E 460, E 464, E 1200; L-Ascorbinsäure; Trennmittel: E 468, E 470b, E 551, E 553b; DL-alpha-Tocopherylacetat; Nicotinamid; Calcium-D-Pantothenat; Eisen-II-fumarat; Zinkoxid; Beta-Carotin; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminmononitrat; Riboflavin; pflanzliche Öle (Kokos-, Palmkernöl); Kupfersulfat; Retinylacetat; Pteroylmonoglutaminsäure; Chrom-III-chlorid; Natriummolybdat; Kaliumjodid; Natriumselenat; D-Biotin; Phyllochinon; Cholecalciferol; Cyanocobalamin; Farbstoff: E 132.

Zusammensetzung pro Tablette		% NRV *
VITAMINE		
Vitamin A (RE) (50 % als Beta-Carotin)	800 µg	100 %
Vitamin E (α-TE)	24 mg	200 %
Vitamin C	80 mg	100 %
Vitamin K	30 µg	40 %
Thiamin	1,65 mg	150 %
Riboflavin	2,1 mg	150 %
Vitamin B6	2,1 mg	150 %
Vitamin B12	7,5 µg	300 %
Vitamin D	15 µg	300 %
Biotin	75 µg	150 %
Folsäure	300 µg	150 %
Niacin (NE)	24 mg	150 %
Pantothensäure	9 mg	150 %
MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE		
Calcium	200 mg	25 %
Phosphor	105 mg	15 %
Magnesium	135 mg	36 %
Eisen	2,1 mg	15 %
Jod	100 µg	67 %
Kupfer	0,5 mg	50 %
Chrom	40 µg	100 %
Molybdän	50 µg	100 %
Selen	45 µg	82 %
Zink	5 mg	50 %

* NRV: Referenzmenge nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

30 Tabletten = 40 g

60 Tabletten = 80 g

Haleon Germany GmbH, D-80258 München

Verzehrempfehlung:

1 Tablette / Tag mit Flüssigkeit einnehmen.

Die empfohlene Verzehrsmenge pro Tag darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Auf den Verzehr weiterer zinkhaltiger Nahrungsergänzungsmittel sollte verzichtet werden. Dieses Produkt enthält Vitamin A. Wenn Sie weitere Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, lesen Sie die Produktangaben, weil sie den gleichen Nährstoff enthalten können.

Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Trocken und nicht über 25 °C lagern. Dose nach Gebrauch wieder verschließen.

Nicht verwenden, wenn die Schutzfolie vor erstmaligem Gebrauch beschädigt ist.

PZN 10110907 / PZN 10110913

Stand: 04-2025