

100428A

UrgoTul Ag/Silver



DE LIPIDOKOLLOID-GAZEWUNDAUFLAGE GETRÄNKT MIT SILBERSALZ

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTul Ag/Silver ist eine mit Silbersalz getränkte Lipidokolloid-Wundauflage. Sie basiert auf der Lipidokolloidtechnologie (TLC), einer von Laboratoires URGO entwickelten Innovation.

UrgoTul Ag/Silver basiert auf der TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag=Silbersalz) aus einem Polyestergitter getränkt mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose), Vaseline, Kohäsionspolymeren und Silbersalz.

UrgoTul Ag/Silver ist nicht haftend, nicht okklusiv und verklebt nicht mit dem Wundbett.

EIGENSCHAFTEN

In Kontakt mit dem Wundexsudat gelieren die Hydrokolloidpartikel (CMC) und verbinden sich mit der Matrix um einen lipidokolloiden Film zu bilden.

Daraus resultieren folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, welches die Heilung begünstigt
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde
- atraumatisches Ablösen zum Schutz des neu gebildeten Gewebes
- schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten
- Schutz der Wundumgebung

Des Weiteren verleihen die in der TLC-Ag-Wundheilungsmatrix enthaltenen Silberionen (Ag+) **UrgoTul Ag/Silver** eine antibakterielle Wirksamkeit, die in der Lage ist, die lokale bakterielle Besiedlung zu reduzieren.

Silber zeichnet sich durch ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum aus, einschließlich gramnegativer und grampositiver Bakterien sowie bestimmter Pilze und Hefen. Es ist besonders wirksam gegen Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes und Pseudomonas aeruginosa (Bacillus pyocyaneus), welche am häufigsten verantwortlich sind für infizierte Wunden.

In-vitro konnte die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage während einer Dauer von bis zu 7 Tagen nachgewiesen werden. Die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage trägt außerdem zu einer Geruchsreduzierung bei.

ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTul Ag/Silver ist für die lokale Behandlung von Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion geeignet: chronische Wunden (Druckgeschwüre und Unterschenkelgeschwüre) und akute Wunden (Verbrennungen zweiten Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, etc).

Da die Wundauflage nicht haftet, ist **UrgoTul Ag/Silver** besonders für die Behandlung von Wunden mit empfindlicher Wundumgebung geeignet

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung reinigen. Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, die Wunde vor der Anwendung von **UrgoTul Ag/Silver** sorgfältig mit physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Wenn es notwendig ist kann **UrgoTul Ag/Silver** mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage der Wunde anzupassen.
- Die Schutzfolien von der Wundauflage entfernen.
- **UrgoTul Ag/Silver** direkt auf die Wunde auflegen.
- Bedecken Sie **UrgoTul Ag/Silver** mit einem Sekundärverband (sterile absorbierende Kompresse, die mit einer Fixierbinde an Ort und Stelle gehalten wird).
- Einen Kompressionsverband anlegen, sofern dieser verordnet wurde.
- **UrgoTul Ag/Silver** sollte alle 1 bis 3 Tage, in Abhängigkeit von der behandelten Wunde und ihrem Heilungsverlauf, gewechselt werden.
- Die maximale Behandlungsdauer mit **UrgoTul Ag/Silver** beträgt einen Monat.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Behandlung mit **UrgoTul Ag/Silver** sollte unter medizinischer Aufsicht erfolgen.
- Die Anwendung der Wundauflage schließt die Notwendigkeit einer geeigneten systemischen antibakteriellen Behandlung von infizierten Wunden in Übereinstimmung mit lokalen Richtlinien nicht aus.
- **UrgoTul Ag/Silver** haftet an chirurgischen Latexhandschuhen. Es wird daher empfohlen diese mit physiologischer Kochsalzlösung anzufeuchten, um die Handhabung zu erleichtern.
- Die kombinierte Anwendung mit anderen lokalen Behandlungen wird nicht empfohlen.
- Da keine spezifischen klinischen Daten vorliegen, nicht bei schwangeren und stillenden Frauen, Neu- und Frühgeborenen anwenden.
- Das medizinische Fachpersonal muss berücksichtigen, dass Daten zur langfristigen und wiederholten Anwendung einer silberhaltigen Wundauflage, insbesondere bei Kindern oder Neugeborenen, nur sehr begrenzt vorliegen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Elektroden oder leitenden Gelen während Untersuchungen mit elektronischen Geräten, z.B. EEG und EKG.
- Nicht in einer Überdruckkammer anwenden.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken hervorrufen.
- (*)Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Nicht anwenden, wenn die sterile Einzelverpackung beschädigt ist.
- Nicht erneut sterilisieren.

KONTRAINDIKATIONEN

- Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Bestandteilen der Wundauflage.
- Nicht bei Patienten anwenden, die mit Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht werden.

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH ; Justus-von-Liebig Str. 16 ; 66280 Sulzbach



Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 CHENOVE - France

100428A

UrgoTul Ag/Silver



NL LIPIDO-COLLOÏDE CONTACTLAAG GEÏMPREGNEERD MET ZILVERZOUTEN

BESCHRIJVING

UrgoTul Ag/Silver is een met zilverzouten geïmpregneerd verband dat dat is ontstaan lipido-colloïde technologie (TLC), een innovatie ontwikkeld door Laboratoires URGO.

Het verband is samengesteld uit een polyester gaas geïmpregneerd met CMC deeltjes (carboxymethyl-cellulosedeeftjes), vaseline, hechtingspolymeren en zilverzouten.

UrgoTul Ag/Silver is niet-adhesief en niet-occlusief en hecht zich niet aan het wondbed.

EIGENSCHAPPEN

In contact met wondexsudaat vormen de hydrocolloïde deeltjes (CMC) een gel die in combinatie met de matrix een lipide-colloïde film vormt.

Dit levert specifieke eigenschappen op:

- Handhaving van een vochtig milieu dat het genezingsproces bevordert.
- Geleert in contact met wondexsudaat.
- Atraumatische verwijdering zonder beschadiging van nieuw gevormd weefsel.
- Pijnloze verwisselingen van het verband.
- Bescherming van de omliggende huid.

Bovendien heeft **UrgoTul Ag/Silver** door de Ag+ ionen van de genezingsmatrix met zilver (TLC-Ag) een antibacteriële werking die de lokale bacteriële belasting kan verminderen.

Zilver vertoont een breed spectrum van antimicrobiële activiteit die de Gram-negatieve en Gram-positieve bacteriën en bepaalde schimmels en gisten omvat. Het is met name effectief tegen Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes en Pseudomonas aeruginosa (pyocyaneusbacil), de bacteriën die meestal verantwoordelijk zijn voor geïnfecteerde wonden. Het verband vertoont in vitro antibacteriële activiteit gedurende 7 dagen. De antibacteriële werking van het verband draagt ook bij tot de vermindering van geurhinder.

INDICATIES

UrgoTul Ag/Silver is geïndiceerd voor de locale behandeling van wonden met een risico op infectie of wonden met van lokale infectie verschijnselen: chronische wonden (decubitus en ulcus cruris) en acute wonden (brandwonden, schaafwonden, traumatische wonden, operatiewonden enz.).

Door de niet-adhesieve eigenschap van het verband wordt **UrgoTul Ag/Silver** aanbevolen voor de behandeling van wonden waarbij met een tere omringende huid

GEBRUIKSAANWIJZING

- Reinig de wond met een fysiologisch zout oplossing. Als er een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan grondig met fysiologisch zout alvorens **UrgoTul Ag/Silver** aan te brengen.
- Indien nodig kan **UrgoTul Ag/Silver** met een steriele schaar op maat van de wond worden geknipt.
- Verwijder de beschermstroken van het verband.
- Breng het **UrgoTul Ag/Silver**-verband direct op de wond aan.
- Dek **UrgoTul Ag/Silver** af met een secundair verband dat geschikt is voor de absorptie van exsudaat), eventueel fixeren met een zwachtel.
- Leg een drukverband aan als dit voorgeschreven is.
- Het **UrgoTul Ag/Silver**-verband kan om de 1 tot 3 dagen worden verwisseld, afhankelijk van de wond en het verloop van de genezing.
- De maximale duur van de behandeling met Urgotul Ag/Silver is één maand.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Behandeling met **UrgoTul Ag/Silver** moet onder medisch toezicht worden uitgevoerd.
- Het gebruik van dit verband doet niets af aan de noodzaak van een passende systemische antibacteriële behandeling van geïnfecteerde wonden in overeenstemming met het lokale beleid.
- **UrgoTul Ag/Silver** kan aan operatiehandschoenen (van latex) kleven. Daarom is het aanbevolen om de vingertoppen van de handschoenen te bevochtigen met fysiologisch zout om zo het verband gemakkelijker vast te kunnen houden.
- Het tegelijkertijd gebruiken van andere lokale behandelingen is niet aan te raden.
- Vanwege het ontbreken van specifieke klinische gegevens niet gebruiken bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en pasgeboren en premature baby's.
- Artsen en andere zorgprofessionals dienen zich ervan bewust te zijn dat er zeer beperkte gegevens voorhanden zijn over langdurig en herhaaldelijk gebruik van zilverhoudende verbanden, met name bij kinderen en neonaten.
- Vermijd contact met elektroden of geleidende gel tijdens elektronische metingen zoals een EEG en ECG.
- Niet gebruiken in een hyperbare kamer.
- Per stuk steriel verpakt verband voor eenmalig gebruik: hergebruik van een product voor eenmalig gebruik kan infectierisico's met zich meebrengen.
- (*) Controleer voor gebruik of de steriele verpakking intact is. Gebruik de inhoud niet wanneer de verpakking is beschadigd.
- Niet opnieuw steriliseren.

CONTRA-INDICATIES

- Bekende overgevoeligheid voor zilver en andere bestanddelen van het verband.
- Niet te gebruiken door patiënten die een MRI-scan ondergaan.



Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 CHENOVE - France