

# Vinorelbiln HEXAL® 20 mg Weichkapseln

## Zur Anwendung bei Erwachsenen

Vinorelbiln

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Wenn Sie die Packungsbeilage auf, Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Vinorelbiln HEXAL und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Vinorelbiln HEXAL beachten?
3. Wie ist Vinorelbiln HEXAL einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist Vinorelbiln HEXAL aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

## 1 Was ist Vinorelbiln HEXAL und wofür wird es angewendet?

Vinorelbiln HEXAL wird in der Krebsbehandlung angewendet; der Wirkstoff Vinorelbiln gehört zur Arzneimittelgruppe der sogenannten Vinca-Alkaloide.

Vinorelbiln HEXAL wird bei Erwachsenen zur Behandlung bestimmter Arten von Lungen- und Brustkrebs angewendet:

- Zur Behandlung des fortgeschrittenen nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms (Stadium 3 oder 4).

- Zur alleinigen Behandlung bei Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs (Stadium 4), bei denen eine Behandlung mit einer anthracyklin- und taxanthaligen Chemotherapie versagt hat oder nicht angezeigt ist.

Eine Anwendung bei Kindern unter 18 Jahren wird nicht empfohlen.

## 2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Vinorelbiln HEXAL beachten?

**Vinorelbiln HEXAL darf nicht eingenommen werden.**

- wenn Sie allergisch gegen Vinorelbiln, andere Vinca-Alkaloide oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- wenn Sie stillen (siehe „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit“)
- wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind und keine wirksame Empfängnisverhütung anwenden
- wenn bei Ihnen eine Operation des Magens oder des Dünnarms vorgenommen wurde
- wenn Sie an einer Erkrankung des Magen-Darmtrakts leiden
- wenn Sie eine schwere Infektion haben oder innerhalb der letzten 14 Tage hatten
- wenn die Anzahl Ihrer weißen Blutzellen (Leukozyten und/oder Neutrophile) und/oder Ihrer Blutplättchen vermindert ist
- wenn Sie eine Langzeit-Sauerstofftherapie benötigen
- wenn Sie vor kurzem eine Impfung gegen Gelbfieber erhalten haben oder eine solche Impfung planen.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Vinorelbiln HEXAL einnehmen.

- Wenn Sie an einer Herzerkrankung infolge einer zu geringen Blutzufuhr zum Herzen leiden oder gelitten haben (koronare Herzerkrankung, Angina pectoris) oder starke Schmerzen in der Brust haben
- wenn Ihre Fähigkeit, Alltagsaktivitäten zu erledigen, deutlich eingeschränkt ist (reduzierter Allgemeinzustand)
- wenn Sie eine Strahlentherapie erhalten und das Behandlungsfeld für Sie beinhaltet. Eine Behandlung mit Vinorelbiln HEXAL sollte nicht gleichzeitig erfolgen.
- wenn Sie derzeit Anzeichen oder Symptome einer Infektion haben (wie Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen). Teilen Sie dies Ihrem Arzt umgehend mit, sodass er gegebenenfalls notwendige Untersuchungen veranlassen kann.
- wenn Sie empfindlich werden sollen. Von Lebendimpfstoffen (z. B. Impfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln) wird abgeraten, da das Risiko einer möglicherweise tödlich verlaufenden Impfkrankheit besteht.
- wenn Sie an einer schweren Lebererkrankung leiden, die nicht mit Ihrer Krebserkrankung in Zusammenhang steht und wenn Sie schwanger sind.

### Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat, da mögliche Risiken für das Kind bestehen. Vinorelbiln der Wirkstoff von Vinorelbiln HEXAL Weichkapseln, kann erbgutschädigend wirken und verursacht im Tierversuch Missbildungen. Sie dürfen Vinorelbiln HEXAL in der Schwangerschaft nicht einnehmen, es sei denn, Ihr behandelnder Arzt ist für Sie unbedingt erforderlich. In diesem Falle sollte eine medizinische Beratung über das mit der Behandlung verbunden Risiko von schädigenden Wirkungen für das Kind erfolgen.

Sie dürfen nicht stillen, wenn Sie Vinorelbiln HEXAL einnehmen.

Als Frau im gebärfähigen Alter müssen Sie vor Beginn und während der Therapie mit Vinorelbiln HEXAL und bis 7 Monate danach sichere empfängnisverhindernde Maßnahmen anwenden. Tritt während der Behandlung dennoch eine Schwangerschaft ein, informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt. Wenn Sie während der Therapie eine Schwangerschaft oder schwanger werden, teilen Sie dies sofort der gynäkologischen Beratungsstelle aufsuchen. Vinorelbiln HEXAL Weichkapseln können erbgutschädigend wirken, daher wird auch bei Kinderwunsch nach einer Therapie eine gynäkische Beratung empfohlen.

Männern, die mit Vinorelbiln HEXAL behandelt werden, wird empfohlen, während der Behandlung und bis zu 4 Monate danach kein Kind zu zeugen und sich vor Therapiebeginn, wegen möglicher irreversibler Unfruchtbarkeit durch die Therapie mit Vinorelbiln HEXAL, über die Möglichkeit einer Spermakonzentrierung beraten zu lassen.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Untersuchungen zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Sie sollten jedoch auf keinen Fall fahren, wenn Sie sich unwohl fühlen oder wenn Ihnen Ihr Arzt geraten hat, nicht zu fahren.

### Vinorelbiln HEXAL enthält Sorbitol

Dieses Arzneimittel enthält bis zu 26,91 mg Sorbitol pro Weichkapsel. Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitteilt, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HF) - eine seltene Vererbungsform der Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann - festgestellt wurde.

## 3 Wie ist Vinorelbiln HEXAL einzunehmen?

Es wird empfohlen, die Einnahme von Vinorelbiln HEXAL unter Aufsicht eines mit dieser Behandlungsart erfahrenen Arztes vorzunehmen. Die Dosis hängt von der Art Ihrer Erkrankung, wegen der Sie behandelt werden, Ihrem Ansprechen auf die Behandlung sowie den weiteren Arzneimitteln/Therapien, die Sie erhalten, ab. Darüber hinaus kann die Dosis in Abhängigkeit davon, wie Sie die Therapie vertragen, angepasst werden, Ihr Allgemeinzustand, Ihre Blutwerte und Ihr Ansprechen auf die Behandlung werden vor, während und nach der Behandlung mit Vinorelbiln HEXAL sorgfältig beobachtet. Die Behandlungsdauer wird durch Ihren Arzt festgelegt und richtet sich nach Ihrem Gesundheitszustand und dem gewählten Therapiechema.

Vinorelbiln HEXAL Weichkapseln sind nur zur oralen Einnahme bestimmt.

**Die maximal zulässige Gesamtdosis von 160 mg/ Woche sollte auf keinen Fall überschritten werden.**

**Nehmen Sie Vinorelbiln HEXAL niemals häufiger als einmal pro Woche ein.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Frägen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, gilt:

**Für die alleinige Behandlung (Monotherapie) folgende Dosisempfehlung:**

**Die ersten drei Anwendungen:** 60 mg/m<sup>2</sup> KOF einmal pro Woche.

**Weitere Anwendungen:** Nach der dritten Anwendung wird eine Erhöhung der Dosis auf 80 mg/m<sup>2</sup> KOF einmal pro Woche empfohlen. Ausgenommen sind Patienten, bei denen die Zahl der neutrophilen Granulozyten während der ersten 3 Gaben von 60 mg/m<sup>2</sup> KOF pro Woche auf unter 500/mm<sup>3</sup> oder

mehr als einmal auf Werte zwischen 500 und 1000/mm<sup>3</sup> abfiel. Je nach Blutbild kann eine Verringerung der Dosis, eine Unterbrechung oder sogar ein Abbruch der Behandlung erforderlich sein.

Fällt die Zahl der neutrophilen Granulozyten während der Behandlung mit 80 mg/m<sup>2</sup> KOF/Woche auf Werte unter 500/mm<sup>3</sup> oder mehr als einmal auf Werte zwischen 500 und 1000/mm<sup>3</sup> ab, ist die Verabreichung der nächsten Dosis bis zur Erholung des neutrophilen Granulozytenwertes zu verschieben und die Dosis für die nächsten 3 Anwendungen auf 60 mg/m<sup>2</sup> KOF/Woche zu reduzieren. Die Dosis kann wieder auf 80 mg/m<sup>2</sup> KOF/Woche erhöht werden – wenn – wie für die ersten 3 Anwendungen festgelegt – die Zahl der neutrophilen Granulozyten nach den letzten 3 Dosen zu 60 mg/m<sup>2</sup> KOF/Woche nicht unter 500/mm<sup>3</sup> oder nicht mehr als einmal auf Werte zwischen 500 und 1000/mm<sup>3</sup> abfiel.

### Für die Kombinationstherapie folgende Dosierungsempfehlung:

Bei Kombinationen mit anderen Arzneimitteln gegen das brennende Ihr Arzt die exakte Dosierung Behandlungsprotokolle entnehmen, die sich in der Therapie der Erkrankung als wirksam erwiesen haben).

Es stehen Weichkapseln mit verschiedenem Wirkstoffgehalt (20 mg, 30 mg und 60 mg) zur Verfügung, sodass die individuelle Dosis genau zusammengestellt werden kann. Anhand nachstehender Tabelle kann Ihr Arzt für jede KOF die entsprechende Dosis ermitteln. Er wird Ihnen die Anzahl und Stärke der einzunehmenden Weichkapseln verschreiben:

KOF [m <sup>2</sup> ]	60 mg/m <sup>2</sup> KOF Dosis [mg]	80 mg/m <sup>2</sup> KOF Dosis [mg]
0,95 bis 1,04	60	80
1,05 bis 1,14	70	90
1,15 bis 1,24	70	100
1,25 bis 1,34	80	100
1,35 bis 1,44	80	110
1,45 bis 1,54	90	120
1,55 bis 1,64	100	130
1,65 bis 1,74	100	140
1,75 bis 1,84	110	140
1,85 bis 1,94	110	150
≥ 1,95	120	160

### Dosisanpassung für besondere Patientengruppen

**Bei eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion**  
Da Vinorelbiln, der Wirkstoff von Vinorelbiln HEXAL Weichkapseln, nur zu einem sehr geringen Teil über die Nieren ausgeschieden wird, ist eine Änderung der Dosis bei eingeschränkter Nierenfunktion nicht erforderlich.

Vinorelbiln HEXAL wird bei Patienten mit geringgradig und moderat eingeschränkter Leberfunktion in reduzierter Dosierung angewendet. Die Sicherheit und Pharmakokinetik waren bei diesen Patienten in den getesteten Dosierungen unverändert. Die Anwendung bei Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung wurde nicht untersucht, daher sollte Vinorelbiln HEXAL bei diesen Patienten nicht angewendet werden (siehe Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“).

### Bei älteren Menschen

In klinischen Studien wurden bezüglich der Ansprechrate keine relevanten Unterschiede bei älteren Patienten gefunden, doch kann eine erhöhte Empfindlichkeit einzelner älterer Menschen nicht ausgeschlossen werden.

### Art der Anwendung

Bevor Sie die Blisterpackung mit der darin enthaltenen Vinorelbiln HEXAL Weichkapsel öffnen, stellen Sie sicher, dass die Weichkapsel nicht beschädigt ist. Aus beschädigter Weichkapseln austretender, flüssiger Inhalt kann bei Kontakt mit Haut, Schleimhaut oder Augen eine Reizwirkung hervorrufen. Sollten es dennoch zu einem solchen Haut- oder Schleimhautkontakt kommen, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit viel Wasser und vorzugsweise isotoner Natriumchloridlösung ab.

**Nehmen Sie keine beschädigte Weichkapsel ein, sondern bringen Sie diese zurück zu Ihrem Arzt oder Apotheker.**

### Handhabung

#### Wie ist die Packung zu öffnen?

1. Schneiden Sie die Blisterpackung entlang der schwarzen Strichlinie mit der Schere auf.
2. Entfernen Sie die Papierschicht.
3. Drücken Sie die Weichkapsel durch die Aluminiumfolie.

Bitte waschen Sie Ihre Hände sorgfältig nach der Einnahme von Vinorelbiln HEXAL.



#### Wie sollten Sie Vinorelin HEXAL einnehmen?

Vinorelin HEXAL Weichkapseln sind **unzerkaut** (wichtig!) mit Wasser einzunehmen, bevorzugt zusammen mit einer leichten Mahlzeit. Nehmen Sie Vinorelin HEXAL Weichkapseln nicht mit einem heißen Getränk ein, da dies würde die Weichkapseln zu schnell auflösen. Die Weichkapseln müssen sofort geschluckt und dürfen nicht gekaut, geknautcht oder aufgelöst werden.

Haben Sie versenktlich eine Weichkapsel zerkratzt oder zerbrochen, spülen Sie den Mund mit Wasser oder vorzugsweise isotoner Natriumchloridlösung gründlich aus und informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

Falls einige Stunden nach der Einnahme von Vinorelin HEXAL die Weichkapseln im Erbrechen auftreten, **nehmen Sie für diese Dosis keine Ersatzdosis ein** und wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.

**Wenn Sie Arzneimittel gegen Erbrechen einnehmen**  
Unter der Einnahme von Vinorelin HEXAL Weichkapseln kann es zu Erbrechen kommen (siehe unter Abschnitt „Welche Nebenwirkungen sind möglich“). Ihr Arzt kann Ihnen eine Begleitbehandlung (z. B. mit oralen 5-HT<sub>3</sub>-Antagonisten wie Ondansetron oder Granisetron) zur Reduktion des Erbrechens verschreiben. Wenn Ihr Arzt Ihnen entsprechende Arzneimittel verordnet hat, nehmen Sie diese wie empfohlen ein. Eine Einnahme von Vinorelin HEXAL Weichkapseln zusammen mit einer leichten Mahlzeit kann das Gefühl von Übelkeit verringern.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Vinorelin HEXAL eingenommen haben, als Sie sollten

Benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder suchen Sie den Notarzt auf (Arzneimittelpackung im letztgenannten Fall unbedingt mitnehmen). Eine Überdosierung von Vinorelin HEXAL kann zu einer Beeinträchtigung der Blutbildung und zu infektiösen Komplikationen (wie Fieber, Schüttelfrost, Husten) oder einem Darmverschluss führen.

#### Wenn Sie die Einnahme von Vinorelin HEXAL vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Arzt, um das Therapieschema anpassen zu lassen.

#### Wenn Sie die Einnahme von Vinorelin HEXAL abbrechen

Ihr Arzt wird entscheiden, wann Sie die Behandlung beenden sollten. Wenn Sie die Behandlung jedoch frühzeitig unterbrechen wollen, sollten Sie mit Ihrem Arzt andere Optionen besprechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

#### Informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt, wenn Sie während der Einnahme von Vinorelin HEXAL eines der folgenden Symptome entwickeln:

- Anzeichen für eine erhebliche Infektion wie Husten, Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen
- schwere Verstopfung mit Bauchschmerzen aufgrund von mangelnder Darmentleerung über mehrere Tage
- Schwindel und Benommenheit beim Aufstehen, Anzeichen für starken Blutdruckabfall
- Auftreten von für Sie ungewöhnlichen Brustschmerzen. Diese Symptome könnten von einer Störung der Herzfunktion herühren, verbunden mit unzureichendem Blutfluss, eine sogenannte ischämische Herzkrankung.
- Schwierigkeiten beim Atmen, Schwindel, Blutdruckabfall, den ganzen Körper betreffendes Ausschlag oder geschwollene Augenlider, Lippen oder Rachen, die Anzeichen von allergischen Reaktionen sein können
- Kopfschmerzen, veränderter Bewusstseinszustand bis hin zu Verwirrtheit und Koma, Krampfanfälle, verschwommenes Sehen, Bluthochdruck, die Anzeichen einer neurologischen Störung wie posteriorem reversiblen Enzephalopathiesyndrom sein können
- Brustkorbschmerz, Atemlosigkeit, Bewusstseinsverlust, die Anzeichen eines Blutgerinnsels in einem Blutgefäß der Lunge (Lungenembolie) sein können

Es handelt sich möglicherweise um schwerwiegende Nebenwirkungen. Es ist möglich, dass Sie dringende medizinische Hilfe benötigen.

Nachfolgend sind mögliche Nebenwirkungen aufgelistet, die unter einer Therapie mit Vinorelin HEXAL auftreten können. Die Nebenwirkungen sind entsprechend ihrer Häufigkeit angegeben.

**Sehr häufige Nebenwirkungen** (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Infektionen durch Viren, Bakterien oder Pilze in unterschiedlichen Bereichen des Körpers (Atemwege, Harndarm, Magen-Darm-Trakt, etc.) ohne gleichzeitige Verringerung der weißen Blutkörperchen (Neutropenie)
- Abnahme der Anzahl der weißen Blutkörperchen, was dazu führen kann, dass Sie anfälliger für Infektionen werden
- Abnahme der Anzahl der roten Blutkörperchen (Anämie), was dazu führen kann; dass Ihre Haut blass erscheint und Sie sich müde oder atemlos fühlen
- Abnahme der Anzahl der als Blutplättchen (Thrombozyten) bezeichneten Blutzellen, die die Blutstillung unterstützen. Dies kann zu einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Blutungen und Blutergüssen führen.
- neurologische Störungen, einschließlich Verlust der tiefen Sehnenreflexe und Veränderung des Berührungsempfindens
- Übelkeit und Erbrechen; eine Behandlung mit Arzneimitteln gegen Übelkeit und Erbrechen kann das Auftreten reduzieren
- Durchfall
- Appetitlosigkeit
- Entzündung im Bereich von Mund und Rachen
- Verstopfung, Bauchschmerzen aufgrund von mangelnder Darmentleerung; eine ergänzende Behandlung mit Abführmitteln kann sinnvoll sein
- andere Magen-Darm-Beschwerden
- Haarausfall, zumeist in leichter Ausprägung
- Müdigkeit/Unwohlsein, Fieber, Gewichtsverlust

**Häufige Nebenwirkungen** (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- durch Verringerung eines bestimmten Typs der weißen Blutkörperchen und/oder eine Beeinträchtigung des Immunsystems hervorgerufene Infektionen (neuropetische Infektion) durch Viren, Bakterien oder Pilze in unterschiedlichen Bereichen des Körpers (Atemwege, Harndarm, Magen-Darm-Trakt, etc.)
- Verringerung eines bestimmten Typs der weißen Blutkörperchen bei gleichzeitig vorliegendem Fieber (febrile Neutropenie)
- Schlaflosigkeit
- erhebliche Probleme mit den Körperbewegungen (erhöhte oder erniedrigte Muskelspannung)
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Beeinträchtigung des Geschmackssinns
- Schläfrigkeit und Unruhe
- Beeinträchtigung des Sehvermögens
- hohe Blutdruck, mit Symptomen wie Kopfschmerzen
- niedriger Blutdruck, mit Symptomen wie Schwindel oder Ohnmachtsgefühl
- Kurzatmigkeit, Husten
- Schwierigkeiten beim Schlucken von Nahrung und Flüssigkeit
- Entzündung der Speiseröhre
- Leberfunktionsstörungen
- Hautreaktionen
- Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kieferschmerzen
- Schmerzen, Brennen und Schwierigkeiten beim Wasserlassen
- andere Beschwerden im Bereich des Urogenitaltrakts
- Schmerzen an verschiedenen Stellen des Körpers, einschließlich Tumorschmerzen
- Schüttelfrost
- Gewichtszunahme

**Gelegentliche Nebenwirkungen** (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

- Gleichgewichtsstörungen (Ataxie)
- Herzversagen, das zu Kurzatmigkeit oder Knöchelschwellungen führen kann
- Herzerkrankung (Herzrhythmusstörungen)
- schwere Verstopfung, die sich gelegentlich zu einem Darmverschluss (paralytischer Ileus) entwickeln kann; die Behandlung kann nach Wiederherstellung einer normalen Darmaktivität fortgeführt werden

**Nicht bekannt** (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

- Verringerung eines bestimmten Typs der weißen Blutkörperchen bei gleichzeitiger, den gesamten Körper betreffender Infektion (neuropetische Sepsis)
- komplizierte Blutvergiftung (Septikämie), die manchmal zum Tode führen kann
- schwere Blutinfektionen (Sepsis), die andere Organe betreffen können
- Blutvergiftung (Septikämie)
- starke Abnahme von Natrium im Blut (kann möglicherweise Müdigkeit, Verwirrtheit, Muskelzuckungen und Koma verursachen). Der niedrige Natriumspiegel kann in einigen Fällen auf eine Überproduktion eines Hormons zurückgeführt werden, das die Flüssigkeitsspeicherung beeinflusst. (Syndrom der inadäquaten Ausschüttung des antidiuretischen Hormons, SIADH).
- Herzinfarkt bei Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen in der Vorgeschichte oder mit erhöhtem Risiko für das Auftreten von Herzkrankungen
- Blutungen im Bereich des Magen-Darm-Trakts
- vorübergehend abnormaler Lebertest

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: <https://www.bfarn.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5 Wie ist Vinorelin HEXAL aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Im Kühlschrank lagern (2 °C -8 °C).

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie fragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.bfarn.de/arzneimittelentsorgung>.

## 6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### Was Vinorelin HEXAL enthält

Der Wirkstoff ist Vinorelin.

Jede Weichkapsel enthält 27,70 mg Vinorelinbis(β,β)-(R,R)-tartrat] entsprechend 20 mg Vinorelin.

Die sonstigen Bestandteile sind; Kapselhülle: Macrogol 400, Polysorbat 80 (pflanzlich), gereinigtes Wasser  
Kapselinhalt: Gellatine, Lösung von partiell dehydratisiertem Sorbitol (Ph.Eur.) (Hauptbestandteil: Sorbitol [Ph.Eur.], 1,4-Sorbitan und Wasser), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E 172), gereinigtes Wasser

#### Wie Vinorelin HEXAL aussieht und Inhalt der Packung

Hellbraune, ovale Weichkapsel  
Länge ca. 11,3 mm  
Breite ca. 6,7 mm

Vinorelin HEXAL Weichkapseln sind in PVC/PVDC/Aluminium-Blistertpackungen mit einer kindergesicherten Papier-PET-Schicht oder in Alu/Alu-Blistertpackungen verpackt.

Packung mit 1 Blisterpackung mit 1 Weichkapsel  
Packung mit 4 Blisterpackungen mit je 1 Weichkapsel

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

#### Pharmazeutischer Unternehmer

Hexal AG  
Industriestraße 25  
83607 Holzkirchen  
Telefon: (08024) 908-0  
Telefax: (08024) 908-1290  
E-Mail: [service@hexal.com](mailto:service@hexal.com)

#### Hersteller

Adalvo Ltd  
Malta Life Sciences Park, Building 1, level 4,  
Sir Temi Zammit Buildings  
San Gwann Industrial Estate  
SGN 3000 San Gwann  
Malta

#### Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Deutschland: Vinorelin HEXAL 20 mg Weichkapseln  
Frankreich: VINORELBINE SANDOZ 20 mg, capsule malle

#### Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2024.