

EN General advice: Carefully read the instructions for use prior to using naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel, even if you have used this medical device before. The information may be amended according to new research and findings in the time since you opened your last package. This medical device can be obtained without a prescription. Nevertheless, naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel should be used with great care in order to get a good result. Keep these instructions for use in case you need to consult them again.

Description and intended usage: naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel is a medical device for the treatment of fungal nail infection (Onychomycosis). Unique formula works immediately and kills fungi on the nail's surface within 20 seconds. It penetrates through the nail and kills the fungi on the nail surface within 20 seconds. Thanks to this instant effect the contamination of other nails can be prevented. It also protects against recurrence, as the brush will not be infected with the fungi. Gel forms a layer with fungistatic properties which creates an unfavourable environment for the development of fungi, and thus creating a physical barrier against spread of fungi.

As one of the causes of fungal nail infections is a moist environment, it is highly recommended to always wear socks of absorbent and natural material such as cotton or wool. Socks made of these natural materials absorb more moisture. This is very important as fungi like high moisture environments so they can multiply. When suffering of fungal nail, it is important to keep feet dry.

Dosage and use: naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel is intended for adults and external use only. Apply the product twice a day with the easy to use brush (in the morning and evening, for example) to the affected area until the new nail has completely grown out. Nail polish must be removed before the naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel can be applied. naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel can be combined with oral antimycotics.

Nail fungus is stubborn to remove, so it is very important to keep using naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel until full regrowth of the nail. To achieve good results the best treatment method is to use it for 3 months.

Mode of action: Thanks to a combination of ingredients, naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel forms a layer that creates an unfavourable environment for the development of fungi in the plate of the nail. It functions as a physical barrier that prevents the spreading of fungi. Urea allows the active ingredients to penetrate deep into the nail plate. naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel reduces the acidity of the nail, creating an unfavourable environment, in which the fungi can no longer grow and spread. In addition, studies show that tea tree oil inhibits the development of hyphal threads.

Ingredients naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Trideceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Nalact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Content: 5ml

Do not use naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel in the event of:

- oversensitivity for one or more of the ingredients;
- if you doubt whether you can use and/or can use it in combination with other medication, then please consult with your doctor or pharmacist.

⚠ Warnings:

- Keep out of reach of children. Not suitable for babies and toddlers.
- naildoc® Rapid gel might cause erythema, irritation, edema, pain, nail discoloration and onycholysis.
- Avoid contact with eyes or mucous membranes.
- Do not apply to open wounds or damaged skin.
- Do not bandage tightly.
- Do not apply heat to the area of application.

Side effects: naildoc® Rapid gel might cause erythema, irritation, edema, pain, nail discoloration and onycholysis.

Use during pregnancy and / or breastfeeding: Do not use this product when you are pregnant or breastfeeding.

Storage method: Store at room temperature (5-25°C) in a dry and dark place in the original container and out of reach of children.

📅 For the expiry date please see the bottom of the packaging.

Medical device: naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel is a class IIA medical device according to the definition of the Council Directive 93/42/EEC.

PK Benelux BV
Vuchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Distributor:
doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6, Austria

Date on which these instructions for use were last revised: December 2020
071886V1.2-v1.2/2020.12



DE Allgemeine Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung des naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gels sorgfältig durch, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits vorher verwendet haben. Die Informationen wurden möglicherweise aufgrund neuer Forschungsergebnisse seit Ihrer letztmaligen Verwendung aktualisiert. Dieses Medizinprodukt kann ohne ärztliches Rezept bezogen werden. Dennoch sollte naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel mit großer Sorgfalt verwendet werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den Fall auf, dass Sie sie erneut lesen möchten.

Beschreibung und Zweckbestimmung: Medizinprodukt zur Behandlung von Nagelpilzinfektionen (Onychomykose). Einzigtartige Formel, die sofort wirkt und Pilze auf der Nageloberfläche innerhalb von 20 Sekunden beseitigt und durch den Nagel penetriert. Dank dieser Sofort-Wirkung wird die Kontamination anderer Nägel verhindert und vor Rückfällen geschützt, da der Applikatorpinsel nicht mit den Pilzen infiziert wird. naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel bildet durch die Kombination der Wirkstoffe eine Schicht mit fungistatischen Eigenschaften, die eine ungünstige Umgebung für die Entwicklung von Pilzen schafft und als physikalische Barriere eine Schutzfunktion gegen die Ausbreitung von Pilzen übernimmt.

Da eine der Ursachen für Nagelpilzinfektionen eine feuchte Umgebung ist, ist es sehr ratsam, immer Socken aus saugfähigem und natürlichen Materialien wie beispielsweise Baumwolle oder Wolle zu tragen. Diese Art von Socken absorbiert mehr Feuchtigkeit. Das ist sehr wichtig, da sich Pilze in einer feuchten Umgebung schneller vermehren können. Halten Sie deshalb bei Nagelpilz Ihre Füße immer trocken.

Dosierung und Verwendung: naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel ist für Erwachsene und ausschließlich für den äußeren Gebrauch bestimmt. Tragen Sie das Produkt zweimal täglich (z. B. morgens und abends) auf die betroffenen Stellen auf, bis der neue Nagel komplett nachgewachsen ist. Nagellack muss vor einer Anwendung von naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel entfernt werden. naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel kann mit oralen Antimykotika kombiniert werden.

Nagelpilz ist hartnäckig zu entfernen, es ist daher sehr wichtig, das naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel bis zum vollständigen Nachwachsen des Nagels zu verwenden. Für gute Ergebnisse, empfehlen wir eine Behandlung über 3 Monate.

Wirkungsweise: Dank einer Kombination von Inhaltsstoffen bildet naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel eine Schicht, die eine ungünstige Umgebung für die Entwicklung von Pilzen in der Nagelplatte schafft. Es dient als physikalische Barriere, die die Vebreitung von Pilzen verhindert. Hamstoff (Urea) lässt die aktiven Bestandteile tief in die Nagelplatte eindringen. naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel reduziert den Säuregehalt des Nagels und schafft so eine ungünstige Umgebung, in der die Pilze nicht mehr wachsen und sich ausbreiten können. Darüberhinaus zeigen Studien, dass Teebaumöl die Entwicklung von Pilzfäden (Hyphen) hemmt.

Inhaltsstoffe naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Trideceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Teabaumöl), Limonene, Glycerin, Nalact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil (Eukalyptusöl), Lavandula Hybrida Oil (Lavendelöl), Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil (Süßorangöl), Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Inhalt: 5ml

Verwenden Sie naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel nicht im Falle von:

- Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe;
- Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie das Produkt in Kombination mit anderen Medikamenten verwenden können, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

⚠ Warnungen:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Babys und Kleinkinder.
- naildoc® Rapid Gel kann Erytheme, Reizungen, Ödeme, Schmerzen, Verfärbungen der Nägel und Onycholysis verursachen.
- Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten vermeiden.
- Nicht auf offene Wunden oder beschädigte Haut auftragen.
- Nicht eng verbinden.
- Vermeide Sie Wärme auf den Anwendungsbereich.

Nebenwirkungen: naildoc® Rapid Gel kann Erytheme, Irritationen, Ödeme, Schmerzen, Verfärbungen der Nägel und Onycholyse verursachen.

Schwangerschaft und Stillzeit: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

🌡 Aufbewahrung: Bei Raumtemperatur (5-25 °C) in der Originalverpackung dunkel und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

📅 Verfallsdatum siehe Bodenlasche

Medizinprodukt: naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIA gemäß der Definition der Richtlinie 93/42 / EWG.

PK Benelux BV
Vuchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Vertrieb: doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6, Österreich

Datum, an dem diese Gebrauchsanweisung zuletzt überarbeitet wurde: Dezember 2020
071886V1.2-v1.2/2020.12



naildoc®

RAPID

FUNGAL NAIL TREATMENT GEL /

NAGELPILZ BEHANDLUNGS-GEL /

GĚL KÖRÖMGOMBA KEZELÉSÉRE /

GEL ZA NOHTE Z GLIVIČNO OKUŽBO /

GEL ZA GLJIVIČNE INFEKCIJE NOKTIJU



HU **Általános tanácsok:** A naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél használatá előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, még akkor is, ha korábban ez az orvostechikai eszköz már használt. Az információmódosulástól az új kiadások és eredmények alapján az utolsó csomag megnyitása óta eltelt időben. Ez az orvostechikai eszköz vény nélkül kapható. Mindazonáltal a naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél körültekintően kell használni, hogy megelőlje eredményét el. Tartsa meg a használati útmutatót, arra az esetre ha esetleg újból át szeretné nézni.

Leírás és rendeltetés: A naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél orvostechikai eszköz a gombás körömfertőzés kezelésére (Onychomycosis). Egyedülálló formulája alapján hatékony, 20 másodpercen belül megöli a gombát a köröm felületén és beszívódi a körömbe. Az azonnali hatásnak köszönhetően megakadályozza a gombás körömkök megfertőzését. Megvéd a visszafertőződéstől is, mivel az eszet nem fertőződik meg gombával.

A gél fungisztikus tulajdonságokból rendelkező réteget képez, ami kedvezőtlen környezetet teremt a gombák elterjedéséhez, és esztétikailag látványt teremt a gombák terjedése ellen.Mivel a gombás körömfertőzés egyik oka a nyelvése környezet, ezért kifejezetten ajánlott nedvszívó és természetes anyagból készült zokni viselni, mint például pamut vagy gyapjú. Az ilyen környezetet anyagból készült zokni több nedvszét is zökni magukba. Ez nagyon fontos, mivel a gomba szaporodását segíti a magas nedvszétgátalmi környezet. Körömgombás megbetegedés esetén fontos, hogy mindig tartás szárazon a lábát.

Adagolás és alkalmazás: A naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél felhőteteknek és csak külső alkalmazásra készült. Alkalmazza a termék naponta kétszer, az egyszerűen használatba esettel (reggel és este, például) az érintett területre, amíg az új köröm teljesen le nem nő. A naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél alkalmazása előtt el kell távolítani minden körömlakkot a körömről. A naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél kombinálhatjuk orális gombaellenes készítményekkel.

A körömgomba csak nehezen szüntethető meg, ezért nagyon fontos, hogy a naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél a köröm teljes újranövését alkalmazzuk. A jó eredmény elérésé érdekében a legjobb kezelési mód a 3 hónapos használat.

Hatásmód: Az összetevők kombinációjának köszönhetően a naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél olyan réteget képez, amely kedvezőtlen környezetet teremt a köröm lemezében a gomba fejlődéséhez. Ez a réteg fizikailag kényszeríti a körömet, amely megakadályozza a gombák terjedését. Az urea lehetővé teszi, hogy a hatóanyagok behatoljanak a körömet, melyébe. A naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél csökkenti a köröm savasságát, kedvezőtlen környezetet teremt a gombák számára, melyben már nem tudnak növekedni és terjedni. Ezeknek a vizsgálatok azt mutatják, hogy a teaolaj gátolja a gombafunkciót kialakulását.

Összetevők Naidoc® Rapid Körömgomba Kezelő Gél: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Naliatec, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cabin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Tartalom: 5ml

Ne használja a naidoc® Rapid körömgomba kezelő gél a következő esetekben:

- túlerzékenység esetén bármely összetevőre;
- ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy alkalmazhatja-e, illetve más gyógyszerrel kombinálhatja-e, kérjük, konzultáljon kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Figyelmeztetések:

- Tartsa távol gyermekektől. Nem alkalmazható csecsemőknel és kisgyermeknél.
- A naidoc® gél erythemat, irritációt, ödémát, fájdalmat, köröm elszíneződést és onkolizist okozhat.
- Kerülje a szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezést.
- Ne alkalmazza nyitl sebekre vagy sérült bőrre.
- Ne kötozze szorosan.
- Ne tegye ki hőnek az alkalmazási területet.

Melékhatások: A naidoc® gél erythemat, irritációt, ödémát, fájdalmat, köröm elszíneződést és onkolizist okozhat.

Terhesség és/ vagy szoptatás: Ne használja ezt a terméket terhesség vagy szoptatás alatt.

Tárolás: Tárolja szobahőmérsékleten (5-25°C) száraz és sötét helyen, az eredeti tartályban, és gyermekek elől elzárva.

A lejárati dátumot lásd a csomagolás alján

Orvostechikai eszköz: A naidoc® Rapid Körömgomba Kezelő Gél, IIA-s osztályú orvostechikai eszköz, a 93/42 /EGK tanács irányelv meghatározása szerint.

PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL

Distributőr:
MediCert Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1182 Budapest
Szakolczi utca 8.
Magyarország

Gyártva t: doc phytolabor
gutterat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG szarmara
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6., Ausztia

SI **Splošno poročilo:** Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo gela za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid, tudi če ste ta medicinski pripomoček že kdaj uporabili. Informacije so morda dopolnjene na podlagi novih raziskav in izsledkov, odkar ste nazadnje uporabili ta izdelek. Za ta medicinski pripomoček ni potrebten zdravilni recept. Kljub temu se priporoča, da se gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid uporablja previdno in skrbno, da je kar najbolj učinkovit. Ta navodila za uporabo shranite, saj jih boste morda še potrebovali.

Opis in namen uporabe: Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid je medicinski pripomoček za zdravljenje glivične okužbe na nohtih (onihomikoza). Edinsvena formula ima takojšen učinek in glivice na površini nohtov odpravi v roku 20 sekundah. Prodre namok skozi noht in odpravi glivice na površini nohta v 20 sekundah. Prodrati hitrejša učinkovanja se lahko prepreči okužbe drugih nohtov. Ščiti pa tudi pred ponovitvijo, saj se čez nekaj ne okuži z glivicami. Gél oblikuje sloj s fungicidnimi lastnostmi, tako da se ustvarja neugodno okolje za razvoj gliv in fizična prepreka, ki preprečuje širjenje gliv.

Ker je eden od vzrokov za glivične okužbe nohtov vlažno okolje, je zelo priporočljivo uporabiti nogavice iz vpojnih in naravnih materialov, npr. bombaže ali volnene. Nogavice iz zela materialov vpojajo več vlage. To je zelo pomembno, saj glivice za razmnoževanje potrebujejo zelo vlažno okolje. Kadar vas mučijo glivice na nohtih, je pomembno, da stopala ohranjate suha.

Odmerjanje in uporaba: Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid je samo za zunanjo uporabo pri odraslih. Na noht, okužen z glivicami, ga nanesite z enostavno ščetko dvakrat na dan (npr. zjutraj in zvečer), dokler ne zstane popolnoma noht. Pred nanosom gela naidoc® Rapid odstranite lak za nohte. Gel za glivice naidoc® Rapid lahko uporabljate skupaj z oralnimi antibiotiki.

Glivice na nohtih so zelo trdozračne, zato je zelo pomembno, da gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtih naidoc® Rapid uporabljate, dokler niste v zrasti posvsem na novo. Za dobre rezultate je najboljši način zdravljenja uporaba tega izdelka 3 mesece.

Način delovanja: Kombinacija sestavin v gelu za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid oblikuje sloj, ta pa ustvari neugodno okolje za razvoj glivic na nohtu. Zato deluje kot fizična prepreka, ki preprečuje širjenje glivic. Urea v gelu omogoča, da aktivne sestavine prodrejo globoko v noht. Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid zmanjša kislost v nohtu, tako da ustvari neugodno okolje, v katerem glivice ne morejo več rasti in se širiti. Poleg tega se je v raziskavah pokazalo, da olje čevca zavira razvoj glivic.

Sestavine: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Naliatec, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cabin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Vsebina: 5 ml

Gela za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid ne uporabljate:

- ob preobčutljivosti za eno ali več sestavin v gelu;
- če ste v dromih, ali ga lahko uporabljate in/ali lahko uporabite skupaj z drugim zdravilom - v tem primeru se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Opozorila:

- Nanesite nedosegljivo otrokom. Ni primerno za dojenčke in malčke.
- naidoc® gel lahko povzroči rdečico, draženje, edem, bolečino, razbarvanje nohtov in oniholizo.
- Izogibajte se stiku z očmi ali sluznicami.
- Ne nanašajte na odprte rane ali poškodovano kožo.
- Se izvognem ne povzete tesno.
- Mesta nanosa ne izpostavljajte toploti.

Neželeni učinek (neželeni učinki): naidoc® gel lahko povzroči rdečico, draženje, edem, bolečino, razbarvanje nohtov in oniholizo.

Uporaba med nosečnostjo in/ali dojenjem: Izdelka ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite.

Hraniti pri: Shranjujte pri sobni temperaturi (5-25 °C) v suhem in temnem prostoru ter zaprt v originalnem vsebniku in nedosegljivo otrokom.

Datum roka uporabe: je natisnjen na dnu ovojnice.

Medicinski pripomoček: Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naidoc® Rapid je medicinski pripomoček razreda Ila po direktivi Sveta 93/42/EEC.

PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL

Proizvedeno za: doc phytolabor
gutterat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6., Ausztia

Distributőr:
InnoPharma d.o.o.,
Tehnološki park 24,
1000 Ljubljana,
Slovenija
info@innopharma.biz

Zadnja revizija navodila: december 2020. 071886V1.2-v1.2/2020.12

HR **Opći sadržaj:** Prije upotrebe pažljivo pročitate upute za uporabu, čak i ako ste već prije upotrebljavali ovaj medicinski proizvod. Možda je došlo do promjena i izmjene informacija u skladu s novim istraživanjima i nalazima u razdoblju otkako ste prethodno otklonili pakiranje. Ovaj medicinski proizvod izdaje se bez recepta. Ali be obzir na to gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju potrebno je upotrebljavati vrlo oprezno kako biste dobili dobre rezultate. Sačuvajte ove upute za uporabu za slučaj da ih ponovno ustrabete pročitati.

Opis i namijenjena upotreba: Gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju medicinski je proizvod za liječenje glivične infekcije noktiju (onihomikoze). Uva jedinstvena formula deluje neposredno, prodire kroz površinu nokta i uništava gljivice u roku 20 sekundi. Zahvaljujući ovom neposrednom djelovanju gel sprječava širenje infekcije na druge nokte i štiti od ponovnog izbijanja infekcije, jer se gljivice neće zadržati na četkici. Gel oblikuje sloj koji ima fungicidna svojstva i stvara nepovoljno okruženje za rast gljivica, jer nastaje fizička prepreka koja onemogućuje širenje gljivica.

Budući da je jedan od uzroka glivičnih infekcija noktiju vlažno okruženje, preporučuje se uvijek nositi čarape od apsorbojabilnih i prirodnih materijala kao što su pamuk i vuna. Čarape od bit prirodnih materijala upijaju više vlage, što je vrlo važno jer gljivice vole vrlo vlažno okruženje u kojima se mogu razmnožavati. Ako imate glivičnu infekciju noktiju, važno je da vam stopala budu suha.

Doziranje i uporaba: Gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju namijenjen je odraslima i samo za vanjsku uporabu. Nanesite proizvod dva puta dnevno (primjerice ujutro i navečer) na razrašeno područje pomoću praktične četkice sve dok potpuno ne izraste novi nokat. Prije nanosa gela naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju odstranite lak s noktiju. Gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju može se kombinirati s oralnim antimoticima.

Ako prekinete liječenje, gljivice na noktima brže će se vratiti. Stoga je vrlo važno da nastavite s uporabom gela naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju. Za postizanje dobrih rezultata najkrajnje naćin liječenja je da gel upotrebljavate 3 mjeseca.

Način djelovanja: Zahvaljujući kombinaciji sastojaka, gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju oblikuje sloj koji stvara nepovoljno okruženje za rast gljivica u pluci nokta. Služi kao fizička prepreka koja sprječava širenje gljivica. Urea omogućuje prodiranje aktivnih sastojaka u pluću nokta. Gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju smanjuje kislost nokta, stvarajući nepovoljno okruženje u kojem gljivice više ne mogu rasti i širiti se. Osim toga, studije pokazuju da ulje čevca sprječava rast gljivica.

Sastojci gela naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Naliatec, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cabin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Sadržaj: 5ml

Nemojte upotrebljavati gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju u slučaju:

- prekomjerne osjetljivosti na jedan ili više sastojaka;
- ako niste sigurni da ga možete upotrebljavati ili/da ga možete upotrijebiti u kombinaciji s drugim lijekom, onda se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

⚠ Opozorjenje:

- Čuvajte izvan dosegma male djece. Nije za dojenčad i malu djecu.
- naidoc® gel može uzrokovati crvenilo, nadraženo, edem, bol, diskoloraciju noktiju i oniholizu.
- Izbjegavajte kontakt s očima ili sluznicama.
- Nemojte nanositi na otvorene rane ili oštećenu kožu.
- Nemojte čvrsto povući za niti pri upotrebi zavojca.
- Područje primjene nemojte izlagati toplini.

Nuspojava: naidoc® gel može uzrokovati crvenilo, nadraženo, edem, bol, diskoloraciju noktiju i oniholizu.

Uporaba tijekom trudnoće i/ili dojenja: Ovaj proizvod nije za trudnice i dojenje.

Način čuvanja: Čuvajte na sobnoj temperaturi (5-25°C) na suhom i mračnom mjestu u izvornom pakiranju izvan dosegma male djece.

⚠ Rok valjanosti: potražite na dnu pakiranja.

Medicinski proizvod: Gel naidoc® Rapid za liječenje glivične infekcije noktiju medicinski je proizvod klase rizika IIA u skladu s definicijom Direktive Vijeća 93/42/EEZ.



A használati utasítás legutóbbi felülvizsgálatának időpontja: december 2020 071886V1.2-v1.2/2020.12



Zadnja revizija upute za uporabu: prosinac 2020. 071886V1.2-v1.2/2020.12

Kontakt:
InnoPharma d.o.o.,
Podružnica Zagreb za promidžbu
Srebrnjak 61, 10000 Zagreb
Hrvatska
info@innopharma.biz

PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL

Proizvedeno za: doc phytolabor
Gutterat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6., Ausztia

