

**Gebrauchsinweisung****Produktbeschreibung**

PermaFoam Classic ist ein Schaumverband, bestehend aus einem hydrophilen Polymer in dreidimensionaler Struktur, der wirksam Wundexsudat aufnimmt und in ein feuchtes Wundmilieu sorgt. PermaFoam Classic Border verfügt zusätzlich über einen umlaufenden, selbsthaftenden Kleberand, der mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist.

**Zusammensetzung**

- PU-Schaum
- Polycrylat
- PU-Folie

**Indikationen**

PermaFoam Classic ist ein steriler, wickelfreier Polyurethan-Schaumverband für den Einmalgebrauch, der bei moderat bis stark exsudierenden, akuten und chronischen Wunden indiziert ist, wie etwa venösen Ulzera (Beinulzera), Dekubitus Grad II–III und diabetischen Fußulzera. Gewebsnahtwunden, Hautschürflungen und Schnittverletzungen.

**Anwendungshinweise**

1. Die Wunde mit physiologischer Lösung oder nach ärztlicher Anweisung reinigen und die umgebende Haut behutsam trocknen.  
2. Die Wundfläche entsprechend der Wundgröße auswählen, sodass die mittige Kompresse die Wundfläche etwa 1–2 cm übersteigt.  
3. Für eine nicht selbsthaftende Ausführung von PermaFoam Classic: die weiße Seite von PermaFoam Classic auf die Wunde legen, sodass die beige Außenseite der Wunde abgewandt ist. Darüber einen zusätzlichen Fixierverband anlegen.

4. Für PermaFoam Classic Border: Die Schutzfolien abziehen, die weiße Seite der Schaumkompresse auf die Wunde legen und den Kleberand gut andrücken.

PermaFoam Classic kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Wie häufig ein Verbandwechsel erforderlich ist, hängt vom Wundzustand und der Exsudatmenge ab.

**PermaFoam Classic Sacral:** Siehe Diagramm 1.

**PermaFoam Classic Concave:** Siehe Diagramm 2.

**PermaFoam Classic Tracheostomy:** Siehe Diagramm 3.

**PermaFoam Classic Border:** Siehe Diagramm 4.

**Kontraindikationen**  
PermaFoam Classic sollte nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt.

**Vorsichtsmaßnahmen**  
• Das Produkt darf nicht bei infizierten Wunden verwendet werden.  
• Bei Auftreten von Rötungen oder allergischen Reaktionen die Behandlung mit PermaFoam Classic abbrechen.  
• Bei Wunden infolge von Durchblutungsstörungen oder diabetischem Fußulkus sollte der Wundzustand täglich überprüft werden.

• Vor einer Behandlung mit Strahlung, einschließlich Röntgenstrahlung, Ultraschall und Mikrowellen wird vor einer Thermotherapie sollte das Produkt abgenommen werden.  
• PermaFoam Classic darf nicht im Verbindung mit Wasserstoffperoxid verwendet werden.

**Produktentwurf**  
Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollen Wegwerfkomponenten von PermaFoam Classic gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen**  
Es sind keine Daten verfügbar, die die Anwendung des Verbands bei sensiblen Patientengruppen wie Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem widersprechen. Der Wundverband sollte bei diesen Patientengruppen daher nur mit Vorsicht und auf Anweisung des behandelnden Arztes verwendet werden. Hinweis für Anwender und/oder Patienten: Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Die Weiterverwendung eines Einmalproduktes ist gefährlich. Die Wiederverwendung von Einmalprodukten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen.

• Wenn PermaFoam Classic im folgenden Text genannt wird, bezieht sich dies auf alle Aufmachungen; davon abweichende Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt.  
Weitere Informationen auf Anfrage.

Stand of Information: 2021-08-18

DE – PAUL HARTMANN AG  
Paul Hartmann-Strabe 12 · 89522 HEIDENHEIM, GERMANY

AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. · 2355 Wiener Neudorf  
CH – IVE HARTMANN AG · 8212 Neuchâten

**Instructions for use**

**Product description**  
PermaFoam Classic is a hydrophilic polymer with a three-dimensional foam structure which can effectively absorb wound exudate and maintain a moist wound environment.

PermaFoam Classic Border also has an adhesive border coated with a polyacrylate adhesive.

**Composition**

- PU foam
- Polycrylate
- PU film

**Indications**  
PermaFoam Classic is a sterile, non-medicated single-use polyurethane foam dressing indicated for medium to highly exuding, acute and chronic wounds, such as venous ulcers (leg ulcers), pressure ulcers II-IV, diabetic foot ulcers, donor sites, abrasions, incisions.

**Contraindications**  
PermaFoam Classic should not be used on patients with a known hypersensitivity to any of its ingredients.

**Precautions**  
• Do not use the product in case of infected wounds.  
• If redness or allergic reactions occur, please stop treatment with PermaFoam Classic.  
• In case of rashes or reactions after allergies, discontinue the treatment with PermaFoam Classic.

• If the plaie est causee par un trouble circulatoire ou un ulcère du pied diabétique, veuillez vérifier quotidiennement l'état de la plaie.  
• Veuillez retirer le produit avant d'appliquer la radiothérapie, y compris les rayons X, la thérapie par ultrasons, la thermothérapie et le traitement micro-ondes.

• Si la plaie est causée par un trouble circulatoire ou un ulcère du pied diabétique, vérifiez quotidiennement l'état de la plaie.  
• Veuillez retirer le produit avant d'appliquer la radiothérapie, y compris les rayons X, la thérapie par ultrasons, la thermothérapie et le traitement micro-ondes.

• Do not use PermaFoam Classic in association with the peroxide of hydrogen.

**Elimination of product**  
Aim of reduce the risk of infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables de PermaFoam Classic doivent être éliminés conformément aux lois, réglementations et normes locales applicables et aux normes de prévention des infections.

**Precautions particulières**  
• Si l'application de l'adhésif est associée à l'utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et en l'absence de données supplémentaires, veuillez consulter votre médecin.

**Contraindications**  
PermaFoam Classic est contre-indiqué chez les patients présentant une allergie connue à l'un des composants.

**Précautions**  
• Ne pas utiliser le produit en cas de plaies infectées.  
• En cas de rougeurs ou de réactions allergiques, veuillez interrompre le traitement avec PermaFoam Classic.

• Si la plaie est causée par un trouble circulatoire ou un ulcère du pied diabétique, veuillez vérifier quotidiennement l'état de la plaie.  
• Veuillez retirer le produit avant d'appliquer la radiothérapie, y compris les rayons X, la thérapie par ultrasons, la thermothérapie et le traitement micro-ondes.

• Do not use PermaFoam Classic in association with the peroxide of hydrogen.

**Elimination of product**  
Aim of reduce the risk of infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables de PermaFoam Classic doivent être éliminés conformément aux lois, réglementations et normes locales applicables et aux normes de prévention des infections.

**Precautions particulières**  
• Si l'application de l'adhésif est associée à l'utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et en l'absence de données supplémentaires, veuillez consulter votre médecin.

**Contraindications**  
PermaFoam Classic est contre-indiqué en patients com hypersensibilité a alguno de sus componentes.

**Precauciones**  
• No utilizar el producto si la herida está infectada.

• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local y los estándares de prevención de infecciones.

**Medidas especiales de precaución**  
• En caso de erupciones o reacciones alérgicas, interrumpa el tratamiento con PermaFoam Classic.  
• Si la herida es causada por un trastorno circulatorio o una úlcera de pie diabético, compruebe su estado a diario.  
• Retire el producto antes de aplicar cualquier tratamiento con radiación, incluidos los rayos X, ultrasonidos, ultrasonidos, terapias y tratamientos con microondas.

• No utilice PermaFoam Classic en combinación con peróxido de hidrógeno.

**Eliminación del producto**  
Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o contaminación del medioambiente, los componentes desechables de PermaFoam Classic deben atenderse a los procedimientos de eliminación conforme a la normativa local

