

Käyttöohjeet

Cutimed® Sorbion® Sachet

Tuotekuvaus

- Cutimed® Sorbion® Sachet a) Erittäin imukykyinen sidos b) Cutimed® Sorbion® Sachet on steriili, hydroaktiivinen, gelidän muodosta, tuledusnestettä runsaasti imevähavassidos. Sidos koostuu voimakkaasti vetää pidiättävästä, erittäin imukykyisestä ydinkerroksesta sekä hyposalergeenisestä polypropyleenisistä valmistetusta ulkokerroksesta. Sidoksen molempia puolia voidaan käyttää haavaa varten. Tuote ei sisällä farmakologisesti vaikuttavia aineita, eikä sinä ole kiinnitys- tai ilma-aineita.

Ominaisuudet

Cutimed® Sorbion® Sachet imee haavaneuvesta erittäin imukykyisen ydinmateriaalin ja pitää ne sisällään myös puristuksessa. Tämä poistaa haavan paranemista estäviä tekijöitä, kuten bakteereja, proteaaseja ja tulehduksellistoitteita, ja minimoi vuoto- ja maseraatoriskin. Samalla sidos pitää haavapinnasta kosteuden, mikä tulee kehon omaa haavan paranemista. Cutimed® Sorbion® Sachet -sidoksen suuren imukykyisen ansiosta haava voi levätä pidempään tavonamaisiin siteisiin verrattuna. Epämielellivät hajut vähenävät tehostetun nesteen (kattoliipakapselitien ansiosta. Nekroottinen kudus tarttuu sidokseen, jota vaihdettaessa se saadaan pois hellävaraisesti. Tämä auttaa puhdistamaan haavan hellästi.

Käyttötarkoituks

Cutimed® Sorbion® Sachet on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa seuraavien, kohtalaisesta tai erittäin runsaasti haavaneuvesta erittäin haavojen hoitoon: painehaavat, säärähaavat, diabeettiset jalkahaavat ja muut sekundäärisesti paranevat haavat, vuotavat vatsaleikkauksiahaat, ihon fistelit, ulseerovrat karsinomaat, auneimet leikkauksen jälkeiset haavat ja muut samankaltaiset haavaneuvesta erittäin haavat.

Huomautus: erityismuuttolitu Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage -sidos on suunniteltu käytettäväksi kettimäisen, dreenin jien, kanssa.

Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos et ole varma, sopiiko tuote sinulle.

Ei saa käyttää

Vasta-aiheita ei tunneta.

Varoitukset ja varotoimenpiteet

Ei saa käyttää, jos pussi on violltunut tai jo avattu, koska sidoksen steriiliys on taattu vain silloin, kun pussi on aamaton ja vahingoittumaton ennen käyttöä. Cutimed® Sorbion® Sachet on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Uudelleenkäyttö voi johtaa infektiin tai riskikonstataminiin riskin lisääntymiseen. Ei saa steriloita uudelleen. Cutimed® Sorbion® Sachet -sidosta tulee käyttää lääkäriin valvonassa. Noudata aina yhdessä käytettävien tuotteiden käyttöohjeita. Älä leikkaa sidosta. Sen on pssytävä ehjinä ja leikkaamattona. Ennen kuin asetat Cutimed® Sorbion® Sachet -sidoksen paikalleen, varmista, että haavassa on riittävä määrä eritettä. Kosketusta seuraavien tulee välttää: haavan reunat vähintään 1 cm:n/4 tuuman verran. Jos hoidettavan iia heikkenee, paranemista ei tapahdu tai ilmenee haittavaikutuksia, käänny lääkäriin tai muun sopivan terveydenhoidon ammattilaisen puoleen. Normaalin paranemisprosessiin liittyen haavan koko saattaa aluksi ohimenevästi suurentaa; pyydä lääketieteen ammattilaista määrittämään haavan koon, värin tai hajun merkittävien muutosten syitä. Cutimed® Sorbion® Sachet -sidosta ei saa käyttää sellisten hoitojen yhteydessä, joissa kehitetty kuunnutta tai joissa käytetään suurtehoista säteilyä (UV-, y- tai röntgensäteily), sillä se saattaa vaarantaa tuotteen mekaanisen eheyden.

Käyttö muiden haavanhoitotuotteiden kanssa

Cutimed® Sorbion® Sachet -sidosta ei saa käyttää öljy- tai rasvapohjaisten tuotteiden, salvojen tai voiteiden kanssa, sillä ne saattavat tukkia sidoksen huokoset ja vähentää sidoksen tehokkuutta.

Käyttöohjeet

Sidoksen asettamisessa ja poistamisessa on noudatettava hyvää kiiniistä käytäntöä.

Valmistelu:

- Desinifoi kädet ennen sidoksen asettamista ja käytä käsiaineita.
- Huuhtele haava tarvittaessa ja poista jäljelle jäänyt puhdistusliuos.
- Valitse sopivankokoinen ja limankostuudessa, jotta haavan reunat vähintään 1 cm:n/4 tuuman verran.
- Älä kosketa haavavyönnä ottaessasi tuotetta ulos pussista.
- Asettaminen:**
 - Laita sidos haavalle. Sidoksen molempia puolia voidaan käyttää haavaa varten.
- Sidoksen kiinnittämisen muiden tuotteiden avulla:**
 - Kiinnitä sidos sen jälkeen, kun olet valinnut oikean kiinnitystavoin haavaa ympäröivän alueen ja ihon kunnon mukaisesti. Kiinnityksen voidaan käyttää kalvoja, kirurgista teippiä, siteitä tai mitä tahansa muuta sopivaa kiinnitysmateriaalia. Ota sidoksen kiinnityksessä huomioon imeytymisestä johtuva laajeneminen.

Käyttö muiden tuotteiden kanssa:

- Cutimed® Sorbion® Sachet -sidosta voidaan käyttää infektiotuneissa haavoissa antimikrobiaalikehoidon lisäksi.
- Cutimed® Sorbion® Sachet -sidosta voidaan tarvittaessa käyttää toissijaisena sidoksena yhdessä muiden sidoksen kanssa a. yhdessä Cutimed® Sorbact®/Sorbaact® -sidosten kanssa infektiotuneilla haavoilla.
 - yhdessä haavan kontaktikierroksen kanssa haavoilla, joissa on kuivia aueluita (esim. Cuticell® Contact),
 - yhdessä geelipohjaisten tuotteiden kanssa nekroottisilla haavoilla (esim. Cutimed® Gel).

Sidoksen vaihto: Cutimed® Sorbion® Sachet voi olla paikallaan enintään seitsemän päivää haavan paranemistilanteen ja sen mukaan, kuinka märkä haavavidos on. Sidos on suositeltavaa vaihtaa aluksi 24 tunnin välein, ja myöhemmin vaihtoväliä harvennetaan tarpeen mukaan. Sidoksen ei saa koskaan antaa vettyä kauttaaltaan.

Puisto:

Ottaksesi pois Cutimed® Sorbion® Sachet -sidoksen, poista kiinnitysnauhat, nosta Cutimed® Sorbion® Sachet -sidosta yhdestä kulmasta, poista sidos varovasti ja hävitä se. Haavakudoksen ja -eritteiden kertyminen Cutimed® Sorbion® Sachet -sidokseen on toivottava vaikutus, joka edistää haavan puhdistumista (pehmeä puhdistus).

Säilytys ja hävittäminen

Säilytä sidos puorissa suorasta auringonvalosta tavanomaisessa huoneenlämpötilässä ja limankostuudessa. Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti, esimerkiksi tavallisena kotitalousjätteenä tai kiiniensä jättäen.

Huomautus

Kaikki tähän laitteeseen liittyvät vahingot tulee raportoida BSN medical GmbH: lle ja maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Bruksanvisning

Cutimed® Sorbion® Sachet

Produktbeskrivning

- Cutimed® Sorbion® Sachet a) Superabsorbierende bandage b) Cutimed® Sorbion® Sachet er en steril, hydroaktiv, geldannende og sterkt eksudatabsorbierende sårbandasje. Dressingen består av en sterkt vannholdende, superabsorbierende kerne og et ytre lag av hypoallergenis polypropylen. Begge sider av bandasjen kan påføres sår. Produktet inneholder ingen farmakologisk aktive stoffer, og er fritt for bindemidler og limhoder.

Egenskaper

Cutimed® Sorbion® Sachet absorberer og holder sårvaske i den superabsorbierende kjernen, selv under kompresjon. Dette fører til fjerning av sårhelingshemmende faktorer, inkludert bakterier, proteaser og inflammatoriske mediatører, og minimerer risikoen for lekkasje og maserasjon. Samtidig opprettholder bandasjen et fuktig sårmiljø, som støtter kroppens egen sårheling. Den høye absorpsjonskapasiteten til Cutimed® Sorbion® Sachet muliggjør langvarig sårhvile sammenhengt med konvensjonelle sårbandasjer. Den forbedrede væskshåndteringskapasiteten reduserer ubehagelig lukt. Vev som ikke er levedyktig, tester seg på bandasjen og fjernes forsiktig når du bytter bandasje, noe som tillater raskere forskytning debridement.

Tiltenkt formål

Cutimed® Sorbion® Sachet er beregnet som behandling for utsøndrende sår med moderat til høy væskemengde, f.eks. at tryksår, bensår, diabetiske fotsår og andre sår som deles gjennom sårheling, utsøndrende laparotomier, fistler i huden, betente karsinomer, postoperativ dehisens og lignende, utsondrende sår. Merk: Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage ble på grunn av den spesifikke utformingen utviklet for bruk med katetre, drænger osv.

Ta kontakt med legen din dersom du er usikker på om produktet egner seg for deg.

Begrensninger

Ingen kjente kontraindikasjoner.

Advarsler og forholdsregler

Må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet, da bandasjens sterilitet kun garanteres når pakningen er uåpnet og uskadd før bruk. Cutimed® Sorbion® Sachet er kun til engangsbruk. Gjenbruk kan føre til økt risiko for infeksjon eller krysskontaminering. Skal ikke steriliseres på nytt. Cutimed® Sorbion® Sachet skal brukes under medisinsk tilsyn. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Ikke kut bandasjen. Den må forbi intakt og hel. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal du sørge for at såret har tilstrekkelig mengde sårvaske. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (risiko for tåking og ubehag) og øyområder. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for et produkt som brukes i kombinasjon. Følg alltid instruksjonene for alle produkter, der anvendes i kombination. Der må ikke skæres i bandasjen. Den skal forblive intakt og hel. For der påføres Cutimed® Sorbion® Sachet, skal det sikres, at såret har en tilstrekkelig mengde eksudat. Unngå kontakt med følgende områder: slimhinner (ris