

Onligol

MACROGOL 4000

20 Beutel mit 10 g

Wirkt abführend
Elektrolytfrei, aromafrei, in beliebigem Getränk auflösbar.

WAS IST ONLIGOL?

Onligol ist ein Abführmittel als Pulver für eine **Trinklösung** auf Basis von **Macrogol 4000**.
Es enthält keine Hilfsstoffe, Aromen oder Zucker. Es kann in einem beliebigen Getränk aufgelöst werden, wie z.B. Tee, Kräutertee, Milch, Brühe oder Fruchtsaft.
Die Packung enthält 20 Beutel mit je 10 g Macrogol 4000.
Onligol ist auch in einer 400-g-Dose mit Messlöffel erhältlich.

WANN WIRD ONLIGOL ANGEWENDET?

Onligol wird insbesondere bei chronischer Verstopfung angewendet.
Es wird auch bei gelegentlich auftretendem unregelmäßigem Stuhlgang angewendet.

WIE WIRKT ONLIGOL?

Dank seiner wasserbindenden Eigenschaft macht Onligol den Stuhl weicher, erleichtert dadurch die Entleerung und fördert so das Wohlbefinden und schafft Erleichterung.
Es verursacht keine Krämpfe, Bauchschmerzen oder Stuhldrang.
Onligol entfaltet seine Wirkung auf natürliche Weise: Es wird im Darm nicht resorbiert oder fermentiert; es reizt nicht die Schleimhaut und wird unverändert mit dem Stuhl ausgeschieden.

WIE WIRD ONLIGOL ANGEWENDET?

Lösen Sie Onligol auf, indem Sie das Pulver in ein beliebiges Getränk einrühren. Der Inhalt eines Beutels (10 g) wird in mindestens 125 ml (bei Kindern auf 150 ml erhöhen) eines beliebigen, auch heißen Getränks wie Tee, Kräutertee, Milch, Brühe oder Fruchtsaft aufgelöst. Onligol verändert den Geschmack des Getränks nicht.
Trinken Sie die hergestellte Lösung. Es wird empfohlen, Onligol zwischen den Mahlzeiten einzunehmen.

DOSIERUNG (sofern vom Arzt nicht anders verordnet):

Erwachsene und Kinder mit einem Körpergewicht über 20 kg (11 Jahre):
Die Dosis ist 10 g (1 Beutel), 1-3 mal täglich, je nach individuellem Ansprechen. Um eine schnellere Wirkung zu erzielen, kann die maximale Tagesdosis (30 g) in einer einzigen Dosis eingenommen werden.

Bei längerem Gebrauch kann die Dosis auf 10 g (1 Beutel) 1-2 mal täglich, auch jeden zweiten Tag, vorzugsweise abends, reduziert werden.

Kinder bis 20 kg (11 Jahre):

Die Dosierung ist entsprechend dem Körpergewicht anzupassen. Daher wird die Verwendung der Dose mit 400 g Pulver mit Messlöffel empfohlen, mit der die Dosis dem tatsächlichen Bedarf des Kindes angepasst werden kann, bis ein weicher Stuhlgang erreicht ist.

Die maximale Tagesdosis darf nicht überschritten werden.

WANN DARF ONLIGOL NICHT ANGEWENDET WERDEN?

Onligol darf nicht eingenommen werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Macrogol, Magen-Darm-Perforation und/oder -Obstruktion.

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Produkt nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kann ich Onligol einnehmen, wenn ich Medikamente einnehme?

Ja, es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt, aber es ist ratsam, das Produkt mindestens 2 Stunden nach der Einnahme von Medikamenten einzunehmen.

Können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten?

Gelegentliche Blähungen und/oder Übelkeit, die bei fortgesetzter Einnahme abklingen.

Seltene Fälle von allergischen Reaktionen (Hautausschlag, Nesselsucht): in diesem Fall müssen Sie die Einnahme von Onligol abbrechen und Ihren Arzt oder Apotheker informieren.

Was passiert im Falle einer Überdosierung?

Es kann zu Durchfall kommen, der nach Absetzen des Präparates spontan abklingt.

AUFBEWAHRUNGSHINWEISE:

In der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in ungeöffneter und vorschriftsgemäß gelagerter Verpackung.

BESONDERE ANWENDUNGSHINWEISE

Während der Behandlung mit Onligol ist es ratsam, eine angemessene Diät einzuhalten, begleitet von der Verabreichung einer oralen Rehydrationslösung (ORL), um eine Dehydrierung zu vermeiden; es ist jedoch ratsam, Ihren Arzt zu befragen.

Verwenden Sie Onligol nicht länger als 30 aufeinanderfolgende Tage; wenn die Symptome anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. OHNE ZUCKER

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Medizinprodukte, deren Haltbarkeit abgelaufen ist oder die zu entsorgen sind, müssen gemäß den Abfallentsorgungsvorschriften der örtlichen Behörde behandelt werden.

Das Produkt oder seine Verpackung keinesfalls in die Umwelt entsorgen.

Vertreiber: ALFASIGMA GMBH - c/o Design Offices Macherei - Weihenstephaner Straße 12 - 81673 München

 Hersteller: SIIT Srl Via Ariosto, 50/60
20090 Trezzano s/N (MI) Italien

Rev. 09 von 09/2024



ALFASIGMA 

45003393
03011527/1