

sidosen æstetista pakkaleen.

3. Sidoksen valmistelu ja asettaminen:

- a. Kun lattat sidostaavaalle, valitse sidoksen koko niin, että sen keskellä oleva imukykyinen haavavyyny on vähintään 1 cm suurempi kuin haava.
- b. Kun tuote asetetaan ehjälle iholle, valitse sidos, joka peittää herkan alueen kokonaan
- c. Poista sidos steriilistä pakkauksesta.
- d. Vain AQUACEL™ Foam kiinnityvässä sidoks Poista suojapaperi siten, että sormet koskettavat limapinta mahdollisimman vähän.
- e. Pidä sidosta haavan tai suojattavan ihon päällä ja kohdista sidoksen keskiosa haavan tai suojattavan ihoalueen keskiasian kanssa.
- f. Sidosta ei saa venyttää, kun sitä asetetaan pakkalleen. Kun kyseessä on AQUACEL™ Foam kiinnityvä sidos, tasoitella limareunus pakkaleen. Varmista, että polttiaan nivelet pääsevät liikkumaan riittävästi.
- g. Sidosta voi leikata: tällöin on käytettävä liksäki teippiä tai kalvoisidosta, jolla sidos voidaan sulkea ja bakteerien pääsyä haavaan estää.

4. Sidoksen poistaminen:

- a. Sidosta ei voida irrottaa, kun se on kiinnitetä tarkoituksensa mukaisesti (sidoksen ei saa antaa yksikkyistää) tai kun sidos vaurioituu/liikautuu.
- b. Jos sidoksen poistaminen on vaikeaa, sidos tulee kyllästää steriilillä keittosuolaliuoksella tai vedellä ja poistaa hitaasti.
- c. Poista sidos painamalla ihoa varovasti, kottahamalla varovasti sidoksen yhtä kulmaa ja jatkamalla niin, kunnes kaikki reunat ovat irrt. Irota sidos varovasti ja hävitä se paikallisten kliinisten käytäntöjen mukaisesti.
- d. Sidoksen kulman voi nostaa ihon tarkistusta varten ja sulkea sitten uudelleen vain, kun kyseessä on emmaltelohäikeäsiä hoito. Sidos täytyy vaihtaa, jos iho on rikkoutunut.

Internet-osoitteemme on www.convatec.com.

Valmistettu iossa-Britanniassa

© 2023 Convatec Inc.

*/**merkki osoittaa Convatec Inc.: yhtiön tavaramerkkiä. AQUACEL, AQUACEL-logo ja

Hydrofiber ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.



PRODUKTBESKRIVELSE

- AQUACEL™ Foam bandage er en steril, Hydrofiber™ skumbaseret sårbandage, der består af:
 - en vandtæt, åndbar ydre polyurethanfilm, som danner en bakteriel og viral barriere
 - en blød, flærlaget, absorberende midterperde, der indeholder polyurethaniskum og Hydrofiber™ (naturlægemiddelpolyurethan) sårkontaktlag. Puden absorberer og fuktholder fugt, eksudater og bakterier.
 - AQUACEL™ Foam klæbende har en perforeret hudkontaktkant med silikoneklæber til at klæbe bandagen til patienten.

KLINISKE FORDELE

- AQUACEL™ Foam er designet til at beskytte skræbelig hud mod fugt, forskydning og friktionskader.
- AQUACEL™ Foam er designet til at give et fugtigt sårhelingsmiljø, der fremmer autolytisk debridering og fjerner døddummet i kontaktfladen mellem sårét og bandagen.
- AQUACEL™ Foam er designet til at behandle overskydende eksudativeluxer, som dehidrerer kan beskytte såråbnet og den omgivende hud.

TILSIGTET ANVENDELSE

- AQUACEL™ Foam bandager kan anvendes i samråd med sundhedspersonale, til behandling af væskende, ikke-væskende sår og til beskyttelse af intakt hud.
- AQUACEL™ Foam bandage kan indgå i en omfattende plejeprotokol for at beskytte intakt hud mod nedbrydning.
- AQUACEL™ Foam bandager kan anvendes som primær eller sekundær bandage.

INDIKATIONER

- AQUACEL™ Foam bandager er indiceret til behandlingen af:
 - Børnsår
 - Tryksår
 - Diabetiske fodsår
 - Operationsår
 - Delvis forbrændinger (andengrads forbrænding)
 - Traumatisk sår

TILSIGTETE BRUGERE

- AQUACEL™ Foam bandager er beregnet til at blive anvendt af sundhedspersonale, patienter og omsorgspersoner.
- MÅLPATIENTPOPULATION**
 - AQUACEL™ Foam bandager er beregnet til at blive brugt på patienter med en af sårtyperne angivet i indikationerne eller, der kræver beskyttelse fra hudnedbrydning.

KONTRAINDIKATIONER

- AQUACEL™ Foam bandager må ikke anvendes til personer, som er overfølsomme over for og/eller har haft en allergisk reaktion på bandagen eller bestandele af intakt hud.
- AQUACEL™ Foam bandager er ikke kompatible med oxidationsmidler som hydrogenperoxid eller hypokloritopløsninger.

FORSIGTHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

- Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal kasseres i henhold til lokale forordninger.
- Må ikke anvendes efter den anførte udløbsdato.
- AQUACEL™ Foam bandager er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug kan medføre eget risiko for infektion og krydskontaminering samt forsinket sårheling.
- Til klæbende væskende sår kan AQUACEL™ Foam bruges som sekundær bandage sammen med en primær bandage, så som AQUACEL™ Extra.
- Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårbehandlingsprodukter uden først at have konsulteret sundhedspersonale.
- Hvis der klippes i den klæbende bandage, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.
- Yderligere tape eller andre fikseringsmetoder vil være påkrævet for at fastgøre AQUACEL™ Foam ikke-klæbende bandage på plads.
- AQUACEL™ Foam bandager er vandafvisende, dog må de ikke nedsænkes under vand ved badning eller svømming.
- AQUACEL™ Foam bandager er ikke kompatible med oliebaserede produkter.
- Under kroppens normale helingsproceffer fjernes ikke-levende væv først fra sårét (autolytisk debridement), hvilket kan i starten få sårét til at se større ud.
- Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandageskift observeres irritation (rødem og inflammation), maceration (huden bliver hvidlig), hypergranulation (overdreven vækstmedde), tegn på infektion (egst smerte, blødning, varme/rødem i omgivende væv, øget sekretion fra sårét) eller ændringer i såréts farve og/lugt.
- Efter anvendelsen kan dette produkt udelukkende i potentielt biologisk risiko. Håndernes og bortskaftes i henhold til accepteret medicinsk praksis og gældende lokale, statstilge og nationale love og forordninger.
- Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette produkt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den indberettet til fabrikanten og det bemyndigede organ lland, hvor brugen og/eller patienten er bost.

KONTAKT OG ANVENDELSENS VARIGHED

- AQUACEL™ Foam bandager kan bæres i op til 7 dage, bandagene skal skiftes tidligere, hvis det er klinisk indiceret, og er sikre til kontinuerlig brug.

BRUKSANVISNING

- 1. Opbevaring**
 - Opbevar ved stuetemperatur (10°C - 25°C/50°F - 77°F). Undgå sollys. Opbevarer tørt.
- 2. Forberedelse og rengøring af sårét og huden:**
 - Inden anlæggelse af bandagen rengøres sårét med en passende sårrens, og den omkringliggende hud tørres.
- 3. Forberedelse og applicering af bandagen:**
 - a. Ved anlæggelse på et sår, så vælg en bandagestørrelse, der sikrer, at den absorberende pude i midten er mindst 1 cm (1/3 tommer) større end sårét.
 - b. Ved anlæggelse på intakt hud, så vælg en bandage, som dækker hele det sårbare område
 - c. Tag bandagen ud af den sterile emballage.
 - d. Kun for AQUACEL™ Foam klæbende: Fjern dækpapiret og undgå så vidt muligt kontakt mellem fingrene og klæbefladen.
 - e. Hold bandagen over sårét eller den del af huden, der skal beskyttes, så midten af bandagen er lige over midten af sårét, eller den del af huden der skal beskyttes.
 - f. Sørg for at bandagen ikke strækkes, når den anlægges. For AQUACEL™ Foam klæbende, glæt den klæbende kant ud. Sørg for at led er tilstrækkeligt bøjede, for at tillade patientmobilitet.
 - g. Bandagen kan tilkippes. Hvis den tilkippes, brug da yderligere tape eller en film til at klæbe en forsegling og sikre en barriere mod bakterier.
- 4. Fjernelse af bandage:**
 - a. Bandagen skal skiftes, når det er klinisk indiceret (bandagen må ikke blive gennemvædet), eller hvis den bliver beskadiget/beskidt.
 - b. Hvis det er svært at fjerne bandagen, kan bandagen gennemvædes med steril vand eller saltvand og tages langsomt af.
 - c. Bandagen fjernes ved at trykke let på huden og forsigtigt løfte i ét af bandagens hjørner og fortsætte til alle hjørner e fjerne. Fjern forsigtigt bandagen og bortskaft den i henhold til lokale kliniske retningslinjer.
 - d. Kun ved forebyggende behandling må bandagens hjørner løses for at inspicere huden og derefter foreslages en bandage. Skal skiftes, hvis huden er beskadiget.

Besøg os online på www.convatec.com.

Freemittlet i UK

© 2023 Convatec Inc.

*/**angiver et varemærke tilhørende Convatec Inc. AQUACEL, AQUACEL logo og Hydrofiber er registrerede varemærker

no NORSK

PRODUKTBESKRIVELSE

- AQUACEL™ Foam bandasje er en steril Hydrofiber™-skumbandasje som består av:
 - en vannett, pustende utendte polyuretanfilm som utgjør en barriere mot bakterier og virus
 - en myk, absorberende flærlagete i midten som inneholder polyuretaniskum og Hydrofiber™-sårkontaktlag (naturlægemiddelpolyurethan). Puden absorberer og holder inne fuktighet, eksudater og bakterier.
 - AQUACEL™ Foam selvklebende har en hudkontaktkant med silikoneklæber, slik at bandagen kan festes til huden.

KLINISKE FORDELER

- AQUACEL™ Foam er utviklet for å beskytte skjør hud mot fuktighet, skjærkrefter og friksjonskader.
- AQUACEL™ Foam er utviklet for å danne et fuktig miljø for sårtilheling, fremme autolytisk debridering og fjerne dødrom mellom sårét og bandagen.
- AQUACEL™ Foam er utviklet for å håndtere overflødig eksudat som kan skade sårbummen og den omkringliggende huden ytterligere.

TILNÆTET BRUK

- Etter konsultasjon med helsepersonell kan AQUACEL™ Foam-bandasjer brukes til behandling av væskende og ikke-væskende sår, og til beskyttelse av intakt hud.
- AQUACEL™ Foam-bandasje kan inkluderes i en omfattende behandlingsprotokoll for å beskytte intakt hud mot nedbrytning.
- AQUACEL™ Foam-bandasjer kan brukes som en primær eller sekundær bandasje.

INDIKASJONER

- AQUACEL™ Foam-bandasje er indisert for behandling av:
 - børnsår
 - tryksår
 - diabetiske fotår
 - operasjonsår
 - annerlags forbrønning
 - traumatisk sår

TILNÆTTE BRUKERE

- AQUACEL™ Foam-bandasjer skal brukes av helsepersonell, pasienter og omsorgspersoner.

MÅLPASIENTPOPULASJON

- AQUACEL™ Foam-bandasjer er tilnættet brukt på pasienter med en av sårtyperne oppgitt i indikasjonene eller dem som trenger beskyttelse mot hudnedbrytning.

KONTRAINDIKASJONER

- AQUACEL™ Foam-bandasjer er ikke kompatible med oksiderende midler som hydrogenperoksid eller hypoklorittrensinger.
- FORHOLDSREGLER OG BEMERKNINGER**
 - Steriliteten er garantert med mindre emballasjen er skadet eller åpnet for bruk. Ikke bruk produktet hvis emballasjen er skadet eller åpnet for bruk, og kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
 - Skal ikke brukes etter den angitte utløpsdatoen.
 - AQUACEL™ Foam-bandasjer er kun til engangsbruk, må ikke genbrukes. Genbrug kan øve til et risk for infeksjon og kryskontaminasjon og forsinket heling.
 - For svært væskende sår kan AQUACEL™ Foam brukes som en sekundær bandasje sammen med en primær bandasje, slik som AQUACEL™ Extra.
 - Denne bandasje skal ikke brukes sammen med andre sårpleieprodukter uten først å konsultere helsepersonell.
 - Hvis den selvklebende bandasjen kuttes, kan det være behov for tilleggstape for å holde den trygt på plass.
 - Tilleggstape, eller andre festemidler, er nødvendig for å holde AQUACEL™ Foam ikke-klæbende bandasje på plads.
 - AQUACEL™ Foam-bandasjer er dukt sjue. Skal de mildt irritere ikke nedsenkes ved bading eller svømming.
 - AQUACEL™ Foam-bandasjer er ikke kompatible med oliebaserete produkter.
 - Under kroppens normale helingsprosesser blir ikke-levende vev fjernet fra sårét (autolytisk debridering), noe som først kan få sårét til å virke større.
 - Helsepersonell skal konsulteres hvis noe av det følgende observeres under bandageskift: irritasjon (rødt, betennelse), masasjon (huden blir hviter), hypergranulering (for stor vækstmedde), tegn på infeksjon (egst smerte, blødning, varme/redhet på omkringliggende vev, skrekstet eller ending) i såréts farge og/lugt.
 - Etter bruk kan dette produktet potensielt være biologisk farlig. Hånder og kasser i henhold til akseptert medicinsk praksis og gældende lokale og nasjonale lover og forskrifter.
 - Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av dette produktet eller som resultat av dets bruk, skal det rapporteres til produsenten og til den kompetente myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

KONTAKT OG BRUKSVARIGHET

- AQUACEL™ Foam-bandasjer kan brukes i opp til 7 dager. Bandasjen skal skiftes tidligere hvis dette er klinisk indisert, og er trygg å bruke kontinuerlig.

BRUKSANVISNING

1. Opbevaring

- Opbevar ved romtemperatur (10–25°C / 50–77°F). Skal beskyttes mot lys. Skal holdes tørt.

2. Klargjøring av sårstedet og rens av huden:

- Rens området med et egnet sårrensemiddel og tørk den omkringliggende huden for bandasjen legges på.

3. Klargjøring og applicering av bandasjen:

- a. Når den skal påføres et sår, skal du velge en bandagestørrelse hvor den absorberende pute i midten er minst 1 cm (1/3 tommer) større enn sårområdet.
- b. Når den skal påføres intakt hud, skal du velge en bandasje som dekker hele det utsatte området
- c. Ta bandasjen ut av den sterile pakken.
- d. Kun for AQUACEL™ Foam selvklebende: Fjern antrekkspapiret og minimer kontakt mellom fingrene og den klebende overflaten.
- e. Hold bandasjen over sårét eller hudområdet som skal beskyttes, og innsett midten av bandasjen med midten av sårét eller hudområdet som skal beskyttes.
- f. Sørg for at bandasjen ikke strækkes ved påføring. For AQUACEL™ Foam selvklebende glatter du ut den selvklebende kanten. Sørg for at ledene er tilstrækkelig bøyd for å tillate pasientbevegelse.
- g. Bandasjen kan klippes, hvis den klippes, skal ekstra tape eller filmbandasje brukes for å legge en forsegling og sikre en bakterieil barriere.

4. Fjerning av bandasjen:

- a. Bandasjen skal skiftes når det er klinisk indisert (bandasjen må ikke bli overmettet) eller hvis den blir skadet/filmsusset.
- b. Hvis det er vanskelig å fjerne bandasjen, kan bandasjen mettes med steril saltopløsning eller sterilt vann og fjernes langsomt.
- c. For å fjerne bandasjen trykker du vorsomt ned på huden og løfter forsiktig ett hjørne av bandasjen. Fortsett til alle kanten er løstet. Løft bandasjen forsiktig av og kast den i henhold til lokale kliniske protokoller.
- d. Bandasjens hjørne kan kun løses for å inspicere huden og foreslges igjen under forebyggende pleie. Bandasjen må skiftes hvis huden er brutt.

Bestek oss på nett på www.convatec.com.

Laget i UK

© 2023 Convatec Inc.

*/** indikerer et varemærke tilhørende Convatec Inc. AQUACEL, AQUACEL-logoen og Hydrofiber er registrerte varemærker



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Το επίβλημα AQUACEL™ Foam είναι ένα αποστειρωμένο επίβλημα για έλκη με σπέρó Hydrofiber™ που περιλαμβάνει:
 - μια αδιάβροχη, με δυνατότητα απορρόγησης εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης που παρέχει αντιβakterικό και αντι-από φράγμα
 - μια μαλακή, πολυμερική, απορροφητική κεντρική ενέσχυση από σπέρó πολυουρεθάνης και το στρώμα επαφής με το έλκος Hydrofiber™ (vατισρούς καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης). Η ενέσχυση απορροφά και συγκρατεί την υγρασία, το εξοξυγόνα και το βαντίτιο
 - Το αυτοκόλλητο επίβλημα AQUACEL™ Foam έχει κολλητική επίστρωση ολάνης που έρχεται σε επαφή με το δέρμα για την επικόλλησή του επίστρωμα στον ασθενή.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

- Το επίβλημα AQUACEL™ Foam έχει σχεδιαστεί για την προστασία του εύθραυστου δέρματος από την υγρασία, το όξινο και την τριβή.
- Το επίβλημα AQUACEL™ Foam είναι σχεδιασμένο να παρέχει ένα υγρό περιβάλλον επούλωσης για το έλκος, απορροφώντας την αυτολυτική απομάκρυνση του νεκρωτικού ιστού και το εξοξυγόνα, παράλληλα του νεκρό χώρο μεταξύ του έλκους και του σημείου επαφής του επίβληματος με το έλκος.
- Το επίβλημα AQUACEL™ Foam έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση των περιττών επιπένδων (εξιδρώματος που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στον πυθμένα του έλκους και στο περιβάλλον δέρμα.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Τα επίβλημα AQUACEL™ Foam μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν συνεννόησης με επαγγελματία υγείας, για τη θεραπεία εξιδρωματικών ελκών και για εξιδρωματικών ελκών και την προστασία του άθικτου δέρματος.
- Το επίβλημα AQUACEL™ Foam μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα αναλυτικό πρωτόκολλο φροντίδας για την προστασία του άθικτου δέρματος από λύση.
- Τα επίβλημα AQUACEL™ Foam μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια ή δευτερεύοντα επίβληματα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Το επίβλημα AQUACEL™ Foam ενδείκνυται για τη θεραπεία:
 - Ελκών ποδιών
 - Πτεστικών ελκών
 - Ελκών δεξερτικών ποδιού
 - Χειρουργικών ελκών
 - Εγκαυμάτων μερικού πάχους
 - Τραυματικών ελκών

ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΝΕΣ ΠΡΟΟΡΙΞΕΙΣ

- Το επίβλημα AQUACEL™ Foam προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες του τομέα της υγείας και φροντίδας.

ΣΥΝΟΧΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

- Τα επίβλημα AQUACEL™ Foam προορίζονται για χρήση σε ασθενείς με έναν από τους τύπους ελκών που αναφέρονται στις ενδείξεις ή σε ασθενείς που χρειάζονται προστασία του δέρματος από λύση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Τα επίβλημα AQUACEL™ Foam δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άτομα με αλλεργία ή ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης στο επίβλημα ή στα συστατικά που αναφέρονται παραπάνω.
- Τα επίβλημα AQUACEL™ Foam δεν είναι συμβατά με οξειδωτικούς παράγοντες, όπως δεξυόξυαυ υποπυριτωσύνιο (oxidant) ή υποχλωριτωσύνιο νεφρού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΗΤΗΣΕΙΣ

- Η στερεότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη μόνο αν η άμεση συσκευασία του δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει ανοιχτεί πριν από τη χρήση. Η χρησιμοποίηση του προϊόν εν ο συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση και απορρίπτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Μην χρησιμοποιείτε μετά την παύση της αναερόβιας ημερομηνίας λήξης.

- Τα επίβλημα AQUACEL™ Foam προορίζονται για μία χρήση μόνο, μην τα επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης και διασποράς μολύνσης, καθώς και καθυστέρηση της επούλωσης του έλκους.

ΟΛΟΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ

- Εάν ένονα εξιδρωματικά έλκη, το AQUACEL™ Foam μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύον επίβλημα σε συνδυασμό με κύριο επίβλημα όπως το AQUACEL™ Extra.
- Εάν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το επίβλημα μόνι με άλλα προϊόντα φροντίδας ελκών χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον επαγγελματία υγείας.

- Αν το αυτοκόλλητο επίβλημα κατέ, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον ταινία για να στερεωθεί στη θέση του.

- 1. **Ταφρίξιν**
 - Η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 2. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 3. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 4. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 5. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 6. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 7. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 8. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 9. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 10. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 11. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 12. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 13. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 14. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 15. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 16. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 17. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 18. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 19. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 20. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 21. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 22. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 23. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 24. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 25. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 26. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.

- 27. **Ταφρίξιν**
 - Εάν η ταφρίξιν είναι σε μορφή σκόνης (10) 25°C/50°F - 77°F). Να προστατεύεται από το φως. Να διατηρείται στεγνό.