

Beratungshotline 0800 100 833 6
(kostenlos) www.novalac.de

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck.
- Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

ANWENDUNG

Novalac PRE ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Neugeborenen und Säuglingen von Geburt an, als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern zur Muttermilch. **Novalac PRE** kann wie Muttermilch so oft und so viel, je nach Bedarf Ihres Babys gefüttert werden. Bis zum Ende des Flaschenalters geeignet. In **Novalac PRE** ist nur Lactose enthalten, also Milchzucker. Es ist in der Zusammensetzung auf Babys von Geburt an abgestimmt.

DOSIERUNG

| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 |

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac PRE**.

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Trinkmengen und Anzahl aller Mahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Die angegebenen Trinkmengen und die Anzahl der Fläschchen pro Tag sind empfohlene Richtwerte.

WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! Wenn Sie eine Säuglingsmilchnahrung verwenden wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt, geringem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

Novalac PRE kann vom 1. Fläschchen bis zum 6. Monat als alleinige Nahrung gegeben werden, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Nach dem 6. Monat steht **Novalac 2** mit einer altersgerechten Zusammensetzung zur Verfügung.

Hergestellt von **Laboratoires Novalac SA, Genf**



Vertrieb durch **Engelhard
Arzneimittel GmbH & Co. KG**,
Herzbergstraße 3,
D-61138 Niederdorfelden,
www.novalac.de

Unter Schutzatmosphäre verpackt. Die Dose, der Plastikdeckel sowie der Löffel können recycelt werden.

Novalac PRE



Säuglingsmilchnahrung

✓ Nur Lactose enthalten

0-6 Monate

400g

NÄHRWERTE

| | im Durchschnitt | 100g Pulver | 100ml trinkfertige Nahrung |
|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Energie | | | |
| | kJ | 2121 | 276 |
| | kcal | 507 | 66 |
| Fett | g | 26 | 3,4 |
| davon | | | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 12 | 1,6 |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,5 | 0,7 |
| davon | | | |
| - Linolsäure | mg | 4500 | 600 |
| - α-Linolensäure | mg | 405 | 53 |
| - Docosahexaensäure (DHA) | mg | 120 | 16 |
| - Arachidonsäure (ARA) | mg | 60 | 8 |
| Kohlenhydrate | g | 56,8 | 7,4 |
| davon | | | |
| - Zucker | g | 56,8 | 7,4 |
| davon | | | |
| - Lactose | g | 56,2 | 7,3 |
| Ballaststoffe | g | 1,3 | 0,2 |
| GOS (Galactooligosaccharide) | g | 1,9 | 0,2 |
| Eiweiß | g | 10,4 | 1,4 |
| Vitamine | | | |
| Vitamin A | µg | 440 | 57 |
| Vitamin D | µg | 11,2 | 1,5 |
| Thiamin | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavin | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacin | mg | 4,5 | 0,6 |
| Pantothenensäure | mg | 5 | 0,7 |
| Vitamin B ₆ | mg | 0,5 | 0,07 |
| Biotin | µg | 18 | 2,3 |
| Folsäure | µg | 80 | 10 |
| Vitamin B ₁₂ | µg | 1,5 | 0,2 |
| Vitamin C | mg | 60 | 7,8 |
| Vitamin E | mg | 11,5 | 1,5 |
| Vitamin K | µg | 60 | 7,8 |
| Mineralstoffe | | | |
| Natrium | mg | 165 | 21 |
| Kalium | mg | 525 | 68 |
| Chlorid | mg | 400 | 52 |
| Calcium | mg | 380 | 49 |
| Phosphor | mg | 240 | 31 |
| Magnesium | mg | 45 | 5,9 |
| Eisen | mg | 4 | 0,5 |
| Zink | mg | 3,3 | 0,4 |
| Kupfer | mg | 0,38 | 0,05 |
| Jod | µg | 95 | 12 |
| Selen | µg | 22 | 2,9 |

NÄHRWERTE

| | im Durchschnitt | 100g Pulver | 100ml trinkfertige Nahrung |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Mangan | mg | 0,045 | 0,006 |
| Fluorid | mg | <0,45 | <0,06 |
| Weitere Inhaltsstoffe | | | |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurin | mg | 40 | 5,2 |
| L-Carnitin | mg | 20 | 2,6 |
| Nukleotide | mg | 18,6 | 2,4 |

ZUTATEN Magermilch, Milchproteine, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos, Raps), **Lactose (Milch)**, Galactooligosaccharide (**Milch**), **Fischöl**, Tricalciumcitrat, Emulgator (Lecithin [**Soja**]), Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Dikaliumphosphat, Trikaliumcitrat, Dinatriumphosphat, L-Tyrosin, *Mortierella alpina* Öl, Vitamine (A, B₁, B₂, B₆, C, D₃, E, K₁, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothenensäure), Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Eisenpyrophosphat, Taurin, Inositol, Calciumhydroxid, L-Tryptophan, Magnesiumchlorid, Nukleotide (Cytidin-5-monophosphorsäure, Uridin-5-phosphorsäure, Adenosin-5-phosphorsäure, Inosin-5-phosphorsäure, Guanosin-5-phosphorsäure), L-Carnitin, Trinatriumcitrat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte, L-Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat

ZUBEREITUNG Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

1 Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40 °C abkühlen. Oder kohlenstoffarmes Mineralwasser auf maximal 40 °C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.

2 Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel **Novalac** hinzugeben. Bitte ausschließlich den in der Packung liegenden Messlöffel benutzen.

3 Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

4 Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

15P1S08D 3621691
ET1550900

e 400 g



PZN - 20005666