

Renapro® BLG Shot



DATENBLATT

900 ml
15 Shots à 20 g Eiweiß
60 ml Flüssigkeit pro Shot
mit Süßungsmitteln

PZN DE: 2058 0620
PHZ AT: 610 7408
EAN: 40 2705210 0348

Orange

„Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)“

Zum Diätmanagement bei chronischer Niereninsuffizienz mit isoliertem protein-wasting, insbesondere wenn gleichzeitig eine phosphat- und kaliumarme sowie leucinreiche Ernährung mit paralleler Flüssigkeitsrestriktion indiziert ist.

Zusammensetzung

	per 100 ml	Portion à 60 ml
Energie	579 kJ 136 kcal	348 kJ 82 kcal
Fett	0 g	0 g
davon gesättigte Fettsäuren	0 g	0 g
Kohlenhydrate	0 g	0 g
davon Zucker	0 g	0 g
Ballaststoffe	0 g	0 g
Eiweiß - davon Aminosäuren	33 g	20 g
Isoleucin	1,83 g	1,10 g
Leucin	4,58 g	2,75 g
Lysin	3,45 g	2,07 g
Methionin	0,97 g	0,58 g
Phenylalanin	1,05 g	0,63 g
Threonin	1,53 g	0,92 g
Tryptophan	0,62 g	0,37 g
Valin	1,75 g	1,05 g
Histidin	0,45 g	0,27 g
Arginin	0,78 g	0,47 g
Alanin	2,00 g	1,20 g
Asparaginsäure	3,30 g	1,98 g
Glutaminsäure	5,93 g	3,56 g
Glycin	0,40 g	0,24 g
Prolin	1,62 g	0,97 g
Serin	1,13 g	0,68 g
Tyrosin	1,10 g	0,66 g
Cystein	0,85 g	0,51 g
Salz	0,07 g	0,04 g
Mineralstoffe		
Natrium	27 mg	16 mg
Kalium	28 mg	17 mg
Calcium	38 mg	23 mg
Magnesium	1,2 mg	0,7 mg
Phosphor	8,5 mg	5,1 mg
Hydroxy-Methyl-Butyrat	167 mg	100 mg

Osmolarität: 225 mOsmol/ L
Osmolarität: 209 mOsmol/ kg
Phosphor - Eiweißquotient (PEQ): 0,26

Zutaten

Wasser, β -Lactoglobulin aus Kuhmilch, Säuerungsmittel (Zitronen- & Apfelsäure), Calcium-Hydroxy-Methyl-Butyrat, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Aceulfame K).

Indikation

Renapro® BLG Shot ist ein phosphat- und kaliumarmes sowie leucinreiches Eiweißkonzentrat.

Für Vegetarier geeignet.

Warum Leucin?

Leucin ist eine essentielle, verzweigt-kettige Aminosäure (BCAA), die primär für den Muskelaufbau, den Erhalt von Muskelgewebe und die Anregung der Muskelproteinsynthese (MPS) entscheidend ist. Sie aktiviert den mTOR-Signalweg, hemmt den Muskelabbau, unterstützt Heilungsprozesse und dient als Energielieferant.

Verzehrempfehlung für Erwachsene

Nach Anweisungen des Arztes, in Abhängigkeit vom Ernährungszustand und vom Eiweißbedarf des Patienten.

Falls nicht anders verordnet: **1-2 Shots/ täglich**

Renapro® BLG Shot kann problemlos über alle üblichen Magensonden/ PEGs appliziert werden.

Sonden fachgerecht mit Wasser nachspülen.

Nicht parenteral verwenden.

Anwendungshinweise

Fertiggetränk. Renapro® BLG Shot vor dem Verzehr kurz aufschütteln.

Lagerung

Trocken und nicht über Raumtemperatur (22° C) lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Angebrochene Shots im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

Wichtige Hinweise

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden

Renapro® BLG Shot ist eine ergänzende bilanzierte Diät und kein vollständiges Lebensmittel. Daher ist Renapro® BLG Shot nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Stand: 04.2026