

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

elhachelin injekt

Homöopathisches Arzneimittel

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Wann darf elhachelin injekt nicht angewendet werden?

elhachelin injekt darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Mariendistel (*Carduus marianus*) oder anderen Korbblütlern sind.

Vorsichtsmaßnahmen / Warnhinweise

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von elhachelin injekt?
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Wie viel und wie oft sollten Sie elhachelin injekt anwenden?

Soweit nicht anders verordnet:

parenteral 1 ml bis zu 3mal täglich i.v., i.m., s.c., oder i.c. injizieren.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen parenteral bis zu 3mal wöchentlich 1-2 ml i.v., i.m., s.c., oder i.c. injizieren.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung

Wie lange sollten Sie elhachelin injekt anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von elhachelin injekt auftreten?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Dieses Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anzuwenden!

In der Originalpackung aufbewahren.

Zusammensetzung:

1 Amp. zu 1 ml enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Atropinum sulfuricum Dil. D8 0,1 ml, Berberis Dil. D6 0,1 ml, Bryonia Dil. D8 0,1 ml, Carduus marianus Dil. D4 0,1 ml, Chelidonium Dil. D6 0,1 ml, Leptandra Dil. D5 0,1 ml, Lycopodium Dil. D12 0,1 ml, Magnesium chloratum Dil. D6 0,1 ml, Natrium sulfuricum Dil. D8 0,1 ml, gemeinsam potenziert über zwei Stufen.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

Darreichungsformen

Originalpackung mit 10 Ampullen (N1)

Originalpackung mit 50 Ampullen (N2)

Originalpackung mit 100 Ampullen (N3)

Pharmazeutischer Unternehmer:

Infirmarius GmbH

Daimlerstraße 19

73037 Göppingen

Telefon 07161 / 6 06 94 - 0

Fax 07161 / 6 06 94 - 90

Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage

Mai 2007

Apothekenpflichtig

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!