

Gebrauchsinformation

Anwendungsgebiete

Zinkoxid wirkt abdeckend-protectiv und sekretbindend bei akuten und subakuten Hautkrankheiten.

Gegenanzeigen

Keine Anwendung bei Überempfindlichkeit gegen Zink oder andere Bestandteile der Suspension und auf mehr als 20 Prozent der Körperoberfläche.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Auf großen Hautarealen über 20 % der Körperoberfläche nicht anwenden. Emulgatorhaltige Lotio Zinci oxidati SR ist nicht zur Behandlung nässender Hauterkrankungen geeignet.

Kaliumsorbat und Cetylstearylalkohol können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Suspension kann bei Einhalten der Dosierungsanleitung in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Eine großflächige Anwendung, insbesondere an der Brust stillender Frauen, sollte vermieden werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Zinkoxidhaltige Rückstände vor der Anwendung anderer Dermatika vollständig entfernen, da deren Wirkung beeinträchtigt werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

2-3 mal täglich auf die betroffene Stelle auftragen und antrocknen lassen.

Die Dauer der Anwendung ist nicht begrenzt.

Anwendungsfehler

Akute Vergiftungen sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht zu erwarten. Speziell im Kindesalter sind bei versehentlicher Einnahme Übelkeit, Erbrechen, Gastritis und Fieber möglich.

Wenn Sie die Anwendung vergessen haben, wenden Sie nicht die doppelte Dosis an.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Nach Auftragen der Suspension auf stark entzündliche Hautstellen kann ein leichtes Brennen auftreten.

In seltenen Fällen (weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten) Auftreten von allergischen Reaktionen.

Gelegentlich (weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten) Hautrötungen, Spannungsgefühl, Austrocknungserscheinungen, raue Haut und

akanthotische Hautveränderungen (Absetzen der Therapie empfohlen). Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.

Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Präparat nach Ablauf des aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr anwenden. Das

Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch 3 Monate verwendbar. Das Arzneimittel dicht verschlossen, nicht über 25 °C aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Suspensionsreste sollten abgewaschen und nicht abgerieben werden, um eine mechanische Irritation der Haut zu vermeiden.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken).

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

Zusammensetzung

100 g Suspension enthalten:
Wirkstoff: Zinkoxid 25,0 g

Sonstige Bestandteile:

2-Ethylhexylaurat, Glycerol 85 %, nichtionogene emulgierende Alkohole

(Gemisch aus Cetylstearylalkohol, Macrogol-80-cetylstearylether und Glycerolmonostearat), Kaliumsorbat

(Ph.Eur.), Citronensäure, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt
Lotio Zinci oxidati SR ist eine weiße, cremige Suspension und in Originalpackungen mit 100 g (N2) erhältlich.

Stand der Information

März 2026
Apothekenpflichtig!

Zul.-Nr.: 3004448.00.00

Ch.-B.: ??????

Verwendbar bis: ??.???

Emulgatorhaltige Lotio Zinci oxidati SR

25 %ige Suspension zur Anwendung auf der Haut

Hydrophiles Zinkoxid-Liniment 25% (NRF 11.109.)
Dermatikum, Wirkstoff: Zinkoxid

Vor Gebrauch umschütteln!

100 g
N2

Pharmaz. Unternehmer / Hersteller

Pharmachem GmbH & Co. KG
Pharmachem Straße 1
07381 Pörsneck / Thüringen

Pharmachem Straße 1
07381 Pörsneck / Thüringen

Pharmachem Straße 1
07381 Pörsneck / Thüringen

Pharmachem Straße 1
07381 Pörsneck / Thüringen

Pharmachem Straße 1

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

Pharmachem Straße 1

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

Pharmachem Straße 1

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

Pharmachem Straße 1

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen

07381 Pörsneck / Thüringen